

# FUNDAMENTAL 73 WP

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

### COMPOSICIÓN:

BENALAXYL .....	80.00 g/Kg
MANCOZEB .....	650.00 g/Kg
ADITIVOS .....	c.s.p. 1 Kg

Registro PQUA N° 199- SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO: POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto MZA6 Lote15 Urb. Sta. Patricia II Etapa.  
La Molina, Lima Perú  
Telf.: 348-1018 / 349-9609



Fabricante y Formulador:  
**Point Agro-China Limited.**  
Wan Shi Town,  
Yixing, Jiangsu,  
214217 China  
Tel. (86-510) 8785 1001, Fax. 8785 1537



Importado y Distribuido por:  
**SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.**  
Av. Guillermo Dansey 2176  
Lima Cercado - Perú  
Telf.: (01) 336-8645, Fax: (01) 336-8299

Contenido Neto: 1 Kg

N° Lote:  
Fecha de Form :  
Fecha de Venc :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

## LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla, aplicación, almacenamiento y manipulación del producto.
- Causa sensibilización a la piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Causa irritación ligera al tracto respiratorio.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No exponer a mujeres embarazadas.

### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación acudir al médico mostrando la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y si el contacto fuese con la piel lavar con agua y jabón.
- En caso de ingestión efectuar lavado estomacal. Proseguir con un purgante alcalino.
- Tratar los síntomas y proporcionar una terapia necesaria. No tiene antídoto específico.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:  
**CICOTOX: 328-7398**  
**POINT ANDINA 348-1018**
- No dar de beber nada a un paciente inconsciente.

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces y demás organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. no permitir animales en el campo de cultivo.
- Evitar el uso del producto en suelos arenosos o zonas con napas freáticas superficiales.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUNDAMENTAL 73 WP es un fungicida de acción sistémica que previene y cura hongos Peronosporales. Actúa tanto en la parte interna como externa de la planta.

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C (días)	L.M.R. (ppm)	
	Nombre común	Agente causal	gr/200 L	Kg/ Ha		*	**
Papa	"rancho" o "seca seca" o "hielo fungoso"	<i>Phytophthora infestans</i>	500	1 - 2	28	0.02	0.2
Cebolla	"mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	500	1	28	0.2	0.5
Pimiento	"tizón temprano" "mancha foliar"	<i>Alternaria solani</i>	750	1.5	7	0.2	1

P.C.: Período de carencia  
\* L.M.R para Benalaxyl  
\*\* L.M.R. para Mancozeb

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se deben iniciar los tratamientos cuando las condiciones climatológicas sean favorables para el desarrollo del patógeno y repetir con un intervalo mínimo de 7 días dependiendo del grado de infección. Se autoriza un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Efectuar rotación de cultivos.

### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA.

A la mitad de la cantidad de agua agregar la dosis completa de FUNDAMENTAL 73 WP, agitar y completar el volumen de agua, luego volver a agitar.

### EQUIPO DE APLICACIÓN.

FUNDAMENTAL 73 WP se puede aplicar con pulverizadora manual o mecánica. En las aplicaciones cuidar que haya buena cobertura sin llegar a escurecimiento.

### PERIODO DE REINGRESO.

No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

### COMPATIBILIDAD.

No mezclar con productos de reacción alcalina.

### FITOTOXICIDAD.

FUNDAMENTAL 73 WP no es fitotóxico cuando se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL.

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

