

FUNDAMENTAL 73 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA


POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

BENALAXYL80.00 g/Kg
MANCOZEB 650.00 g/Kg
ADITIVOS.....c.s.p. 1 Kg

Registro PQUA N° 199- SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto MzA6 Lote15 Urb. Sta. Patricia II Etapa.
La Molina, Lima Perú
Telf.: 348-1018 / 349-9609



Fabricante y Formulador:
Point Agro-China Limited.
Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu,
214217 China
Tel. (86-510) 8785 1001, Fax. 8785 1537



Importado y Distribuido por:
SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.
Av. Guillermo Dansey 2176
Lima Cercado - Perú
Telf.: (01) 336-8645, Fax: (01) 336-8299

Contenido Neto: 1 Kg

N° Lote:
Fecha de Form :
Fecha de Venc :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "Mantengase bajo llave fuera de los niños"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla, aplicación, almacenamiento y manipulación del producto.
- Causa sensibilización a la piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Causa irritación ligera al tracto respiratorio.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No exponer a mujeres embarazadas.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación acudir al medico mostrando la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y si el contacto fuese con la piel lavar con agua y jabón.
- En caso de ingestión efectuar lavado estomacal. Proseguir con un purgante alcalino.
- Tratar los síntomas y proporcionar una terapia necesaria. No tiene antídoto específico.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:
CICOTOX: 328-7398
POINT ANDINA 348-1018
- No dar de beber nada a un paciente inconsciente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces y damas organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. no permitir animales en el campo de cultivo.
- Evitar el uso del producto en suelos arenosos o zonas con napas freáticas superficiales.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUNDAMENTAL 73 WP es un fungicida de acción sistémica que previene y cura hongos Peronosporales. Actúa tanto en la parte interna como externa de la planta.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C (días)	L.M.R. (ppm)	
	Nombre común	Agente causal	gr/200 L	Kg/ Ha		*	**
Papa	"rancha" o "seca seca" o "hielo fungoso"	<i>Phytophthora infestans</i>	500	1 - 2	28	0.02	0.2
Cebolla	"mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	500	1	28	0.2	0.5
Pimiento	"tizón temprano" "mancha foliar"	<i>Alternaria solani</i>	750	1.5	7	0.2	1
Vid	"mildiu"	<i>Plasmopara viticola</i>	300-400	1.5 - 2	30	0.3	5

P.C.: Periodo de carencia * L.M.R para Benalaxyl ** L.M.R. para Mancozeb

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se deben iniciar los tratamientos cuando las condiciones climatológicas sean favorables para el desarrollo del patógeno y repetir con un intervalo mínimo de 7 días dependiendo del grado de infección. Se autoriza un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Efectuar rotación de cultivos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA.

A la mitad de la cantidad de agua agregar la dosis completa de **FUNDAMENTAL 73 WP**, agitar y completar el volumen de agua, luego volver a agitar.

EQUIPO DE APLICACIÓN.

FUNDAMENTAL 73 WP se puede aplicar con pulverizadora manual o mecánica. En las aplicaciones cuidar que haya buena cobertura sin llegar a escurrimiento.

PERIODO DE REINGRESO.

No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD.

No mezclar con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD.

FUNDAMENTAL 73 WP no es fitotóxico cuando se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL.

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

