

NEMISPOR® 80PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb..... 800 g/kg
Aditivos c.s.p.1 kg

Registro PQUA N° 170 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.



Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400.

Contenido neto: 1 kg

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
64 Riverside Wharf Road, Change Town,
Hangzhou, Zhejiang Province - CHINA



NO CORROSIVO

INFLAMABLE



EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Ditiocarbamato.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 13040 o 328-7700
ESSALUD: 0801 10200 o 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y déptelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NEMISPOR® 80 PM es un fungicida polvo mojable de amplio espectro de acción que previene e inhibe infecciones causadas por hongos en plantas al proporcionar una capa protectora a los tejidos. Para preparar el caldo de aplicación llene el recipiente con agua hasta un tercio y agregue la dosis recomendada y agite hasta lograr una suspensión homogénea. Por último complete con agua el recipiente y continúe agítándolo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días, variando de acuerdo al cultivo y a la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso de requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:

NEMISPOR® 80 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

NEMISPOR® 80 PM no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g / 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Algodonero	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternaria</i>	400-500	28	2
Arroz	Mancha carmelita	<i>Helminthosporium oryzae</i>	400-500	28	0.2
Cebolla	Mildíu	<i>Peronospora destructor</i>	500	7	0.5
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	600-800	28	0.1
	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	600	28	0.1
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	750	14	2
Naranja	Podredumbre gris de las flores	<i>Botrytis cinerea</i>	600	28	2
Papa	Hielo fungoso o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	400-500	28	0.1
	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria solani</i>			
Pimiento	Mancha foliar	<i>Alternaria solani</i>	750	7	2
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>			
Tomate	Hielo fungoso o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	400-500	10	2
	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria solani</i>			
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	600	30	2

PC: Periodo de carencia

LMR: Límites máximos de residuos

