"MANTÉNGASE BAJO LLAVE. **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PERIODO DE REINGRESO:

5.0

15,0

Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección. COMPATIBILIDAD:

NEMISPOR® 80 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

NEMISPOR® 80 PM no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

INGENIERO AGRÓNOMO"

PLAGA	DOSIS	P.C.	L.M.R.
Nombre Científico	g / 200 L	(días)	(ppm)
Alternaria alternata	400-500	28	2
Helminthosporium oryzae	400-500	28	0.2
Peronospora destructor	500	7	0.5
Cercospora asparagi	600-800	28	0.1
Puccinia asparagi	600	28	0.1
Colletotrichum gloeosporioides	750	14	2
Botrytis cinerea	400-500	28	2
Phytophthora infestans	400-500	28	0.1
Alternaria solani			
Alternaria solani	750	7	2
Botrytis cinerea			
Phytophthora infestans	400-500	10	2
Alternaria solani			
Botrytis cinerea	600	30	2
M.R.: Límites máximos de resid	IIOS		

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR **EL PRODUCTO** "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Ditiocarbamato.
- En caso de intoxicación. llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoia informativa adjunta
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800 - 13040 o 328-7700 ESSALUD: 0801 10200 o 411 8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb. . 800 g/kg Aditivos. . c.s.p. 1kg

Registro PQUA Nº 170 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por: **NEOAGRUM S.A.C.**



Pj. Camino de Acceso Nº 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400.

Contenido neto: 500 g

NO CORROSIVO

Nº de Lote: F. de Form.: F. de Venc.:

Formulado por: HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD 64 Riverside Wharf Road, Change Town, Hangzhou, Zhejiang Province - CHINA



INFLAMABLE



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR **EL PRODUCTO** "MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forraies. - No comer, beber o fumar durante las operaciones
- de mezcla y aplicación. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante
- las primeras 24 horas. - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y **ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ELPRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NEMISPOR 80 PM es un fungicida polvo mojable de amplio espectro de acción que previene e inhibe infecciones causadas por hongos en plantas al proporcionar una capa protectora a los tejidos.

Para preparar el caldo de aplicación llene el recipiente con aqua hasta un tercio y agregue la dosis recomendada y agite hasta lograr una suspensión homogénea. Por último complete con agua el recipiente y continúe agitándolo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días, variando de acuerdo al cultivo y a la enfermedad.

"CONSULTE CON UN

CUADRO DE USO:

CULTIVO	PLAGA	
	Nombre Común	
Algodonero	Mancha negra de la hoja	
Arroz	Mancha carmelita	
Cebolla	Mildiú	
Espárrago	Cercosporiosis	
	Roya	
Mango	Antracnosis	
Naranjo	Podredumbre gris de las flores	
Papa	Hielo fungoso o rancha	
	Mancha negra de la hoja	
Pimiento	Mancha foliar	
	Moho gris	
Tomate	Hielo fungoso o rancha	
	Mancha negra de la hoja	
Vid	Moho gris	
DC - Poriodo do caroncia		

P.C.: Periodo de carencia





LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**











