"MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUFRA DEL AL CANCE DE LOS NIÑOS"

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 24 horas del tratamiento

COMPATIBII IDAD:

Es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común, no mezclar con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

NEMISPOR 80 PM no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

INGENIERO AGRÓNOMO"

ENFERMEDADES	DOSIS	P.C.	L.M.R.
Nombre Técnico	g / 200 L	(días)	(ppm)
Phytophthora infestans	400-500	28	0.1
Alternaria solani			
Phytophthora infestans	400-500	10	2
Alternaria solani			
Botrytis cinerea	400-500	28	2
Alternaria tenuis	400-500	28	2
Helminthosporium oryzae	400-500	28	0.2
Cercospora asparagi	600-800	28	0.1
Puccinia asparagi	600	28	0.1
Alternaria solani	750	7	2
Botrytis cinerea			
Botrytis cinerea	600	30	2
Colletotrichum gloeosporioides	750	14	2

L.M.R.: Límites máximos de residuos

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRIMEROS AUXII IOS:

- Grupo Químico: Ditiocarbamato.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente. o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante aqua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante aqua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- En caso de ingestión provocar el vómito, lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- Para la irritación de la piel: tratamientos genéricos de la dermatitis. Para la irritació ocular: pomadas o colonias oftálmicas.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arrovos con los desechos v envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de aqua, no menor de 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener los animales fuera de la zona tratada
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No usar el producto en suelos con capa freática

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb. 800 a/ka Aditivos. c.s.p. 1kg

Registro PQUA Nº 170 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por: NEOAGRUM SAC



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 500 q No de Lote.

NO CORROSIVO

F de Form · F de Venc

Formulado por: SINOCHEM NINGBO CO. LTD 21 Jiangxia St. Ningbo 315000





LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla v aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante aqua - Utilice ropa protectora durante el manipuleo,
- las primeras 24 horas. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forraies,
- No reenvasar o depositar el contenido en otros

aplicación v para ingresar al área tratada durante

- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas
- Causa irritación moderada a los ojos
- Evite el contacto con la piel y la ropa

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ELPRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NEMISPOR 80 PM es un fungicida polvo moiable de amplio espectro de acción que previene e inhibe infecciones causadas por hongos en plantas al proporcionar una capa protectora a los teiidos.

Para preparar el caldo de aplicación llene el recipiente con aqua hasta un tercio y agregue la dosis recomendada y agite hasta lograr una suspensión homogénea. Por último complete con aqua el recipiente y continúe agitándolo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días. variando de acuerdo al cultivo v a la enfermedad.

"CONSULTE CON UN

CUADRO DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDADES	
	Nombre Común	
Papa	Hielo fungoso o rancha	
	Mancha negra de la hoja	
Tomate	Hielo fungoso o rancha	
	Mancha negra de la hoja	
Naranjo	Podredumbre gris de las flores	
Algodonero	Mancha negra de la hoja	
Arroz	Mancha carmelita	
Espárrago	Cercosporiosis	
	Roya	
Pimiento	Mancha foliar	
	Moho gris	
Vid	Moho gris	
Mango	Antracnosis	

P.C.: Periodo de carencia























