

# NEOZEB® 80PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb.....800 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Registro PQUA N° 171 - SENASA

Titular del Registro:

NEOAGRUM S.A.C.  
Pj. Camino de Acceso N° 02 – Urb. Parcelación  
Cajamarquilla, Lurigancho – Lima – Perú.



Importado y distribuido por:

GRUPO ANDEX S.A.C.  
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Of. 703.  
Edificio del Park II. Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 253-6444



Contenido neto: 1 kg

N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

Formulado por:  
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD  
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou  
Zhejiang Province - CHINA



NO CORROSIVO



EXPLOSIVO

INFLAMABLE

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

| COLORES: (CÓDIGO PANTONE DE LOS COLORES) |                                   |                                                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                          |                                   |                                                        |
| NEGRO<br>Texto                           | PANT. 293 C<br>Banda Toxicológica | PANT. 206<br>Nombre Comercial<br>Pictograma Inflamable |

| COLORES LOGO NEOAGRUM     |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
|                           |                                           |
| PANT. 343<br>Verde Oscuro | PANT. 1375<br>Sol<br>Pictograma Explosivo |

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Ditiocarbamato.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión provocar el vómito, lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- Para la irritación de la piel: tratamientos genéricos de la dermatitis. Para la irritación ocular: pomadas o colonias oftálmicas.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040      ESSALUD: 411 8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua, no menor de 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener los animales fuera de la zona tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No usar el producto en suelos con capa freática superficial.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NEOZEB 80 PM es un fungicida polvo mojable de amplio espectro de acción que previene e inhibe infecciones causadas por hongos en plantas al proporcionar una capa protectora a los tejidos. Para preparar el caldo de aplicación llene el recipiente con agua hasta un tercio y agregue la dosis recomendada y agite hasta lograr una suspensión homogénea. Por último complete con agua el recipiente y continúe agitándolo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días, variando de acuerdo al cultivo y a la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 24 horas del tratamiento.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común, no mezclar con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

NEOZEB 80 PM no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO:

| CULTIVO   | PLAGAS                  |                                       | DOSIS<br>(g/200 L) | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común            | Nombre Técnico                        |                    |                |                 |
| Algodón   | Mancha negra de la hoja | <i>Alternaria alternata</i>           | 400-500            | 28             | 2               |
| Arroz     | Mancha carmelita        | <i>Helminthosporium oryzae</i>        | 400-500            | 28             | 0.2             |
| Espárrago | Cercosporiosis          | <i>Cercospora asparagi</i>            | 600-800            | 28             | 0.1             |
|           | Roya                    | <i>Puccinia asparagi</i>              | 600                | 28             | 0.1             |
| Mango     | Antracnosis             | <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> | 750                | 14             | 2               |
| Naranja   | Podredumbre gris        | <i>Botrytis cinerea</i>               | 400-500            | 28             | 5               |
| Papa      | Hielo fungoso o ranchar | <i>Phytophthora infestans</i>         | 400-500            | 28             | 0.2             |
|           | Mancha negra de la hoja | <i>Alternaria solani</i>              | 400-500            | 28             |                 |
| Pimiento  | Mancha foliar           | <i>Alternaria solani</i>              | 750                | 7              | 5               |
|           | Moho gris               | <i>Botrytis cinerea</i>               | 750                | 7              |                 |
| Tomate    | Hielo fungoso o ranchar | <i>Phytophthora infestans</i>         | 400-500            | 10             | 2               |
|           | Mancha negra de la hoja | <i>Alternaria solani</i>              | 400-500            | 10             | 2.5             |
| Vid       | Moho gris               | <i>Botrytis cinerea</i>               | 600                | 30             | 1.5             |

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

