

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS"

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar eb pleno crecimiento vegetativo de los
cultivos. Se debe aplicar una vez por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: Se recomienda
reingresar 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Para la conservación de los
granos que serán utilizados como semillas, es
compatible con la mayoría de desinfectantes de
semillas utilizados para prevenir el ataque de
enfermedades fungosas exceptuándose los de
reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos
recomendados y no hay efectos en los cultivos
sucesivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro
garantiza que las características físico-químicas
del producto contenido en este envase
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que
es eficaz para los fines aquí recomendados, si se
usa y maneja de acuerdo con las condiciones e
instrucciones dadas.

INGENIERO AGRÓNOMO"

DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
25 - 30 kg/ha	-	n.d.
25 - 30 kg/ha	-	n.d.
25 kg/ha	n.d.	0.05
330 - 660 g/t de grano	-	0.05
330 - 660 g/t de grano	-	0.05
10 - 15 kg/ha	7	0.05
10 - 15 kg/ha	7	0.05
25 - 50 kg/ha	7	0.05

L.M.R.: Límites máximos de residuos n.d.: No determinado

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y
ENVASES VACÍOS:**
- Después de usar el contenido, destruya este envase y
deposite en los sitios destinados por las autoridades
para este fin.
- Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero
aprobado y enterrados, teniendo cuidado de no
contaminar acequias o depósitos de agua potable.
- No reutilizar los envases.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE :**
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos, no
aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la
aplicación o desechos sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas
necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo
en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

Fenkil® 3% PS

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SECO - DP

COMPOSICIÓN:
Phenthoate..... 30 g/kg
Aditivos..... 970 g/kg

Reg. PQUA N° 194 - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEO AG SAC

Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 kg
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
SERRI SA
Km 9.5 Carretera Central.
Ate-Vitarte
PERÚ

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y
APLICACIÓN:**
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de
mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado
y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa
contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y
aplicación y para ingresar al área tratada durante las
primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con
alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros
envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
- **Grupo Químico: Organofosforado**
- En caso de intoxicación llame al médico
inmediatamente, o lleve al paciente al médico y
muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con
abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la
piel, lavarse con abundante agua y jabón.
En caso de emergencia toxicológica llamar a:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO
AGRUM S.A.C.: 617-6400
- Beber abundante agua salada para inducir el vómito.
- Administrar sulfato de atropina.

LEA CUIDADOSAMENTE LA
ETIQUETA ANTES DE USAR EL
PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
FENKIL 3% PS es un insecticida del grupo de
los fosforados que actúa por contacto,
profundidad e ingestión controlando insectos
que atacan los cultivos recomendados.
Por su selectividad, poder residual y baja
toxicidad para los animales de sangre
caliente, esta recomendado para el control de
plagas de granos en almacenamiento.
Se emplea en espolvoreo, esparciendo el
producto directamente al suelo, follaje o para
tratamientos de paredes, techos y pisos de
molinos, silos y depósitos de granos. Las
aplicaciones se hacen mediante
espolvoreadoras mecánicas o manuales.

"CONSULTE CON UN

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGAS	
	Nombre Común	Nombre Técnico
Algodón	Gorgojo de la chupadera	Eutimothrus gossypii
	Arrebiatado	Dysdercus peruvianus
Espárrago	Barrenador de brotes	Prodiplotis longifila
Granos almacenados		
Arroz	Gorgojo del arroz	Sitophilus oryzae
Frijol	Gorgojo del frijol	Zabrotes subfasciatus
Maíz	Gusano de tierra	Feltia experta
Papa	Gusano de tierra	Feltia experta
	Gorgojo de los andes	Premnotypes vorax

P.C.: Período de carencia



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



VERSIÓN: TRANSFERENCIA
ULTIMA REVISION: 14/05/13