

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS"**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar al pleno crecimiento vegetativo de los cultivos. Se debe aplicar una vez por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: Se recomienda reingresar 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Para la conservación de los granos que serán utilizados como semillas, es compatible con la mayoría de desinfectantes de semillas utilizados para prevenir el ataque de enfermedades fúngicas exceptuándose los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados y no hay efectos en los cultivos sucesivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

INGENIERO AGRÓNOMO"

DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
25 - 30 kg/ha	-	n.d.
25 - 30 kg/ha	-	n.d.
25 kg/ha	n.d.	0.05
330 - 660 g/d de grano	-	0.05
330 - 660 g/d de grano	-	0.05
10 - 16 kg/ha	7	0.05
10 - 16 kg/ha	7	0.05
25 - 50 kg/ha	7	0.05

L.M.R.: Límites máximos de residuos n.d.: No determinado

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y
ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.
- Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrados, haciendo cuidado de no contaminar acequias o depósitos de agua potable.
- No reutilizar los envases.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para abejas y arácnidos benéficos, no aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o desechos sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

Fenkil[®] 3% PS

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SECO - DP

COMPOSICIÓN:

Phenthoate..... 30 g/kg
Aditivos..... 970 g/kg

Reg. PQUA N° 194 - SENASA
Titular del Registro, importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-8400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 kg

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
SERFI S.A.
Km. 9.5 Carretera Central.
Ate-Vitarte
PERÚ

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LEA CUIDADOSAMENTE LA
ETIQUETA ANTES DE USAR EL
PRODUCTO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FENKIL 3% PS es un insecticida del grupo de los fosforados que actúa por contacto, profundidad e ingestión controlando insectos que atacan los cultivos recomendados.

Por su selectividad, poder residual y baja toxicidad para los animales de sangre caliente, está recomendado para el control de plagas de granos en almacenamiento.

Se emplea en espolvoreo, esparciendo el producto directamente al suelo, frotaje o para tratamientos de paredes, techos y pisos de molinos, altos y depósitos de granos. Las aplicaciones se hacen mediante espolvoreadoras mecánicas o manuales.

"CONSULTE CON UN

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGAS	
	Nombre Común	Nombre Técnico
Algodón	Gorgojo de la capulera	<i>Eurynotoma gossypi</i>
	Armadillado	<i>Dysdercus pictiventris</i>
Espárrago	Barrador de brócoli	<i>Protoplasa longella</i>
Granos almacenados	Gorgojo del arroz	<i>Sitophilus oryzae</i>
		<i>Zabrotes subcostatus</i>
Frijol	Gorgojo del frijol	<i>Zabrotes subcostatus</i>
Maíz	Gusano de tierra	<i>Feltia experta</i>
	Gorgojo de los andes	<i>Proceratypus varzi</i>

P.C.: Período de rescate

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSIÓN: 07-5N
ÚLTIMA REVISIÓN: 01-06-11

0002

Fenkil® 3% PS

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SECO - DP

COMPOSICIÓN:

Phenthoate..... 30 g/kg

Aditivos970 g/kg

Titular del Registro: **NEOAGRUM SAC**
Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401
Importado y distribuido por: **NEOAGRUM SAC**
Formulado por: **SEFI S.A**
Km. 9.5 Carretera Central. Ate-Vitarte - PERÚ

Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Reg. PQUA N°: 194 - SENASA
N° de Lote :
F. de Form. :
F. de Venc. :

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: **Organofosforado**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja Informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de emergencia toxicológica llamar a:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEOAGRUM S.A.C.: 617-6400
- Beber abundante agua salada para inducir el vómito.
- Administrar sulfato de atropina.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.
- Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrados, teniendo cuidado de no contaminar acequias o depósitos de agua potable.
- No reutilizar los envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE :

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos, no aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o desechos sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FENKIL 3% PS es un insecticida del grupo de los fosforados que actúa por contacto, profundidad e ingestión controlando insectos que atacan los cultivos recomendados.

Por su selectividad, poder residual y baja toxicidad para los animales de sangre caliente, esta recomendado para el control de plagas de granos en almacenamiento.

Se emplea en espolvoreo, esparciendo el producto directamente al suelo, follaje o para tratamientos de paredes, techos y pisos de molinos, silos y depósitos de granos. Las aplicaciones se hacen mediante espolvoreadoras mecánicas o manuales.

CONSULTE AL INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE RECOMENDACIONES:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Algodón	Gorgojo de la chupadera	<i>Etinobothrus gossypii</i>	25 - 30 kg/ha	-	n.d.
	Arribatado	<i>Dyrdereca peruviana</i>	25 - 30 kg/ha	-	n.d.
Espárrago	Barranador de brotes	<i>Protoplasia longifila</i>	25 kg/ha	n.d.	0.05
Granos almacenados:					
Arroz	Gorgojo de arroz	<i>Sitophilus oryzae</i>	330 - 660 gt de grano	-	0.05
Frijol	Gorgojo de frijol	<i>Zabrotes subfasciatus</i>	330 - 660 gt de grano	-	0.05
Maíz	Gusano de tierra	<i>Feltia experta</i>	10 - 15 kg/ha	7	0.1
Papa	Gusano de tierra	<i>Feltia experta</i>	10 - 15 kg/ha	7	0.05
	Gorgojo de los andes	<i>Fremnotypus vorax</i>	25 - 50 kg/ha	7	0.05

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos N.D.: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar en pleno crecimiento vegetativo de los cultivos. Se debe aplicar una vez por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: Se recomienda reingresar 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Para la conservación de los granos que serán utilizados como semillas, es compatible con la mayoría de desinfectantes de semillas utilizados para prevenir el ataque de enfermedades fungosas exceptuándose los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados y no hay efectos en los cultivos sucesivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Contenido neto: 10 kg

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



31.00 cm

4.5 cm

Fenkil® 3% PS

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SECO - DP

COMPOSICIÓN:

Phenthoate..... 30 g/kg

Aditivos970 g/kg

Titular del Registro: **NEOAGRUM SAC**
Calle Cantuarias 270 Of. 1001-Miraflores-Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Importado y distribuido por: **NEOAGRUM SAC**

Formulado por: **SERFI S.A**

Km. 9.5 Carretera Central. Ate-Vitarte - PERÚ

Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neoagrum

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Reg. PQUA N°: **194 - SENASA**

N° de Lote :

F. de Form. :

F. de Venc. :

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y para ingresar a la área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Organofosforado.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de emergencia toxicológica llamar a:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040

NEO AGRUM S.A.C.: 617-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito.
- Administrar sulfato de atropina.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.
- Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrados, teniendo cuidado de no contaminar acequias o depósitos de agua potable.
- No reutilizar los envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos, no aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o desechos sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FENKIL 3% PS es un insecticida del grupo de los fosforados que actúa por contacto, profundidad e ingestión controlando insectos que atacan los cultivos recomendados.

Por su selectividad, poder residual y baja toxicidad para los animales de sangre caliente, esta recomendado para el control de plagas de granos en almacenamiento.

Se emplea en espolvoreo, esparciendo el producto directamente al suelo, follaje o para tratamientos de paredes, techos y pisos de molinos, silos y depósitos de granos. Las aplicaciones se hacen mediante espolvoreadoras mecánicas o manuales.

CONSULTE AL INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE RECOMENDACIONES:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Algodón	Gorgojo de la chupadera	<i>Estribolthrus posypl</i>	25 - 30 kg/ha	-	n.d.
	Arriñatado	<i>Dytiscus pennsylvanicus</i>	25 - 30 kg/ha	-	n.d.
Espárrago	Barrenador de brotes	<i>Prodiplasis longitarsis</i>	25 kg/ha	n.d.	0.05
Granos almacenados:	Gorgojo de arroz	<i>Sitophilus oryzae</i>	330 - 660 g/ha de grano	-	0.05
	Gorgojo de frijol	<i>Zabrotes sublineatus</i>	330 - 660 g/ha de grano	-	0.05
Maíz	Gusano de tierra	<i>Faeria experta</i>	10 - 15 kg/ha	7	0.05
Papa	Gusano de tierra	<i>Faeria experta</i>	10 - 15 kg/ha	7	0.05
	Gorgojo de los andes	<i>Premnotypes vorax</i>	25 - 50 kg/ha	7	0.05

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos N.D.: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar en pleno crecimiento vegetativo de los cultivos. Se debe aplicar una vez por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: Se recomienda reingresar 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Para la conservación de los granos que serán utilizados como semillas, es compatible con la mayoría de desinfectantes de semillas utilizados para prevenir el ataque de enfermedades fungosas exceptuándose los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados y no hay efectos en los cultivos sucesivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Contenido neto: 22 kg

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

