27.5 cm

14.5 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Moderadamente irritante a los ojos.
- Ligeramente irritante a l a piel.
- Irritante a las vías respiratorias.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y herméticamente cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de manipular el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico Triazoles.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Cuidado. Evite el contacto. Posible carcinógeno.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos buscar atención médica.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. Carbón activado.

Teléfonos de emergencia: CICOTOX : 328 7700; ESSALUD: 411 8000 opción 4
CISPROQUIM: 0800 50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

TEBUZOLE® 250 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSION ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN:
Tebuconazole .....250 g/L
Petróleo destilado .....110 g/L
Aditivos .....c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 173 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto 304. Urb. Santa Patricia
II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono: (01) 348-1018 / (01) 349-9609

Point
ENTREGAMOS CALIDAD

Formulado por:
POINT AGRO - CHINA LTD.
Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu,
214217 China.
Teléfono (86-510) 8785 1001

Contenido Neto: **1L**
Nº de lote:
Fecha de Form:
Fecha de Venc:

NO EXPLOSIVO **NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INDICATIVOS DE USO Y MANEJO
TEBUZOLE 250 EW es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los triazoles su uso está destinado a campos abiertos de cultivos de espárrago, alcachofa, pimiento y tomate para prevenir y controlar el ataque de roya, oidium y botritis.
TEBUZOLE 250 EW tiene efectos sobre la síntesis del ergosterol interrumpiéndola y alterando el desarrollo del hongo.
Las aplicaciones deberán realizarse en horas tempranas del día, evitando las horas de mayor radiación solar o fuertes vientos o presencia de precipitación.
Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS mL / cilindro 200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Alcachofa	"Oidium"	*Leveillula taurica*	150-200	3	0.50
Espárrago	"Roya"	*Puccinia asparagi*	150	14	0.05
Espárrago	"Mancha purpura"	*Stemphylium vesicarium*	100-150	14	0.05
Pimiento	"Botritis"	*Botrytis cinerea*	200	7	0.13
	"Oidium"	*Leveillula taurica*	200	7	0.13
Tomate	"Botritis"	*Botrytis cinerea*	200	7	0.20

P.C.: Periodo de Carencia **LMR:** Límite Máximo de Residuos (partes por millón).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
El número de aplicaciones por campaña pueden ser hasta 5.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
TEBUZOLE 250 EW en general se aplica solo con un surfactante.
Se recomienda no mezclar **TEBUZOLE 250 EW** con concentrados emulsionables.

FITOTOXICIDAD
TEBUZOLE 250 EW no es fitotóxico al cultivo y dosis indicada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

PANTONES

376 C 362 C 341 C 7740 C

LOGO POINT

Yellow C

BANDA TOXICOLÓGICA

C:0 M:100 Y:100 K:0

LOGO TEBUZOLE 250 EW