## ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO LEA ESTA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD MANTENGASE BAJO LI AVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Moderadamente peligroso por inhalación: Irritante para las vías respiratorias: Causa irritación ligera a los ojos: Causa irritación moderada a la piel.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos; y la contaminación de los alimentos.

Durante la mezcla y aplicación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, máscara con filtro, quantes, botas y gorra.

No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.

## No comer, beber, ni fumar durante la manipulación.

Después de la aplicación bañarse con aqua fría y jabón y cambiarse la ropa contaminada.

Conserve YUDO 250 EC en su envase original, herméticamente cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, aleiado del calor, seco y bajo llave.

No almacenar ni transportar junto a alimentos, medicinas, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.

Es tóxico por ingestión.

## NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN

Usar ropa protectora para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

### PRIMEROS AUXILIOS

## GRUPO QUÍMICO: Triazoles.

En caso de contacto cutáneo: Lavar la zona contaminada con abundante aqua fría y jabón.

En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua fría, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Consultar con un médico.

En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo. Consultar con un médico.

En caso de ingestión: sólo si el afectado está consciente, administrar una taza de agua y NO PROVOCAR VÓMITOS, Luego, trasladar al paciente al hospital más cercano. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del

Síntomas de intoxicación: Vértigos, náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, hepatotoxicidad, irritación de la piel, dolor de cabeza, debilidad.

Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

## EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETE.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Av Jose Pardo 620 Of. 409- Miraflores. Telf.: 445-5346 CICOTOX: 328-7398 Anx. 4814. CETOX: 213-2318. ESSALUD: 472-2300

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuaque tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fín.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuático.
- No contaminar ríos, estanques o arrovos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrames, aplicar sobre el producto tierra, aserrín, arena, Recoja y deposítelo en lugares específicos destinados por las autoridades locales para este fin.



# FUNGICIDA AGRICOLA

# CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

## COMPOSICION QUIMICA:

## Ingrediente Activo:

Propiconazol	250 ml/l
Solvente (Ciclohexanona)	240 ml/l
Aditivosc.s.p.	1 litro

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 178 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: CAPEAGRO S.A.C.

CAPEAGRO

FORMULADO POR:

TRUSTCHEM CO. LTD.

D 23rd Floor Golden Eagle International Plaza, 89 Hanzhong Rd. Naniing, 210029, CHINA

Distribuidor:

## CAPEAGRO S.A.C.

Importador v Calle E. Diez Canseco 333, Ofic. E Miraflores - Lima

www.capeagro.com

Nº de Lote: Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

Contenido

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

YUDO 250 EC es un fungicida de movimiento acropetalo que inhibe la biosíntesis del ergosterol de los hongos mediante la demetilación de los esteroides provocando la muerte del hongo.

## Modo de empleo:

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con aqua y agregar la dosis requerida de YUDO 250 EC. luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, aplicar los sobrantes al mismo cultivo.

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

### CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC*	LMR**
	N. Común	N. Científico	L/Cilind.	L/ha	(días)	(ppm)
Espárrago	Roya	Puccinia asparagi	0.05-0.1	0.1-0.2	30	0.05

<sup>\*</sup>PC: Periodo de Carencia

## FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar máximo 2 aplicaciones por campaña.

## PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

Es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. En caso de duda efectuar un ensayo de compatibilidad.

## FITOTOXICIDAD:

No presenta fitotoxicidad en los cultivos, si se siguen las instrucciones recomendadas.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico guímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.















TRIPLE

MODERADAMENTE PELIGROSO **DAÑINO** 















<sup>\*\*</sup>I M R · I (mite máximo de residuos