

12.00 cm

SCAPE[®]₇₃

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Benalaxil	80 g/kg
Mancozeb.....	650 g/kg
ETU	0.38 g/kg
Aditivos c.s.p.....	1 kg

Reg. PQUA N° 186 - SENASA
Titular del Registro: NEO AG S.A.C.

Importado y distribuido por:

NEO AG S.A.C.

Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 kg

N° de Lote:
F. de Form.:
F de Venc.:
Formulado por: SERFI S.A.
Km 9.5 Carretera Central
Ate Vitarte

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

16.50 cm

12.00 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Causa irritación moderada a los ojos
- Ligeramente irritante a la piel
- Su uso continuo causa alergias a la piel, es sensibilizante
- Es ligeramente irritante por inhalación
- Tóxico por ingestión
- No aplicar por personas embarazadas
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico Fenilamidas: **Benalaxil**
- Grupo químico Ditiocarbamatos: **Mancozeb**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- **CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400**
- En caso de ingestión provocar el vómito, lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- Para la irrigación cutánea y de las mucosas: lavados, pomadas oftálmicas, inhalaciones de camomila y tratamientos genéricos de la dermatitis.
- **Contraindicaciones:** Alcohol, aceites y grasas.
- No dar de beber nada a un paciente en estado inconsciente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SCAPE 73 es un fungicida de doble acción. Por su acción sistémica llega y protege todos los órganos de las plantas (yemas, hojas y tallos herbáceos). Su acción de contacto, inhibe el desarrollo del hongo en la superficie de los órganos de la planta.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar las aplicaciones ante la presencia de condiciones ambientales favorables para el desarrollo del hongo o de los primeros síntomas de la enfermedad en los cultivos. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña para los cultivos objetivos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene hasta la mitad el cilindro o tanque con agua y vierta la dosis recomendada de **SCAPE 73**, agítese, complete el agua y vuélvase a agitar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Las plantas deben mojarse por completo sin llegar al escurrimiento, previa calibración de los equipos de aplicación.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **SCAPE 73** es compatible con los insecticidas, fungicidas, y acaricidas de uso común, no mezclar con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No existen evidencias fitotóxicas de **SCAPE 73** para los usos propuestos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis kg / 200 lt	P.C. días	L.M.R. ppm
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Papa	Hielo o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0	28	0.02
Tomate	Hielo o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4 - 0.6	28	0.50
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.4 - 0.6	28	0.20
Lechuga	Mildiu	<i>Bremia lactucae</i>	0.4	28	0.50
Pimiento	Pudrición radicular	<i>Phytophthora capsici</i>	0.5	15	0.05

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

