# FORSEM® 80PM

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

## POLVO MOJABLE - WP

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

| | |
|---|---|
| Captan..... | 800 g/kg |
| Aditivos..... | csp 1kg |

**Reg. PQUA N° 181-SENASA**

Titular del Registro y Distribuidor:

AgroKlinge
a member of ADAMA

**AGRO KLINGE S.A.**
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco.
Lima - Perú.
Telf: (01) 641-0000

Formulador:

TQC

***Tecnología Química y Comercio S.A.***
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348 -1020
R.U.C N° 20307150981

Lote Nº:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

**Contenido Neto: 1 Kg**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

29.5 cm

19.5 cm

29.5 cm

## "LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
## "MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- El producto es irritante para los ojos, la piel y el aparato respiratorio. Evite el contacto directo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Pftalimida
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.
- Su ingestión accidental produce síntomas de intoxicación como diarrea, náuseas, vómitos, debilidad muscular, hipotermia, anorexia. Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta.
- Hacer un lavado gástrico evitando la aspiración del tóxico.
- No administrar leche, aceites comestibles ni alcohol.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**Nota al médico:** Antídoto: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 411-8000 Op.4, AGRO KLINGE S.A.: (01) 641-0000.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

®Marca registrada

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: FORSEM 80 PM** es un fungicida preventivo que actúa por contacto con efecto residual. Se aplica en el tratamiento de semillas y en pulverizaciones para el control de enfermedades que afectan a flores, frutos y hojas.

**SISTEMA Y FORMA DE APLICACIÓN:**

**ASPERSIONES FOLIARES**

Aplicar **FORSEM 80 PM** previa mezcla con agua, con equipos de aspersión terrestre. No aplicar con temperaturas mayores a 30 °C.

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** 400 a 600 L/ha

**TRATAMIENTO DE SEMILLAS**

**METODO "SLURRY" (semilla de frijol y algodón):** Espolvorear la dosis indicada de **FORSEM 80 PM** sobre la semilla previamente humedecida, remover uniformente la mezcla hasta cubrir las semillas totalmente.

**METODO DE INMERSION (semilla de papa):** Disolver 400 a 500 g de **FORSEM 80 PM** en 100 litros de agua. Sumergir los tubérculos por 2 a 3 minutos. Dejar escurrir y proceder a la siembra.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS: APLICACIONES FOLIARES**

| CULTIVO | ENFERMEDAD | | DOSIS | | | P.C. | L.M.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | kg/ha | g/cil. 200 L | g/moch 20 L | días | (ppm) |
| PAPA | "Hielo" "Rancha" | *Phytophthora infestans* | 1,6-2 | 400-500 | 40-50 | 7 | 0,05 |
| TOMATE | "Podredumbre de flores y frutos" | *Botrytis cinerea* | 1,5-2,5 | 400-500 | 40-50 | 7 | 5 |
| CLAVEL | "Mancha negra de la hoja" | *Alternaria dianthi* | 2-3 | 500-700 | 50-70 | 7 | -- |

**TRATAMIENTO DE SEMILLA**

| CULTIVO | ENFERMEDAD | | DOSIS | | P.C. días | L.M.R (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | | | | |
| ALGODON | "Chupadera" | *Rhizoctonia solani* *Fusarium oxysporum* | 5 g/Kg semilla | 230 g/qq semilla | (*) | --- |
| FRIJOL | | | 3-5 g/Kg semilla | 75-125 g/25 Kg semilla | (*) | 2 |
| PAPA | | | 400-500 g/100 L de agua/1000 Kg semilla | | (*) | (*) |

**P.C.= Período de carencia / L.M.R. = Límite máximo de residuos**

**(*) No procede por ser tratamiento a la siembra**

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Siendo el producto un fungicida de uso preventivo, realizar como máximo una sola aplicación por campaña cuando se observen los primeros síntomas ó las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina y aceites agrícolas.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO SENASA

19.5 cm