29.5 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FORSEM® 80PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Captan..... 800 g/kg
Aditivos..... csp 1kg

Reg. PQUA N° 181-SENASA

Distribuidor:

AgroKlinge
A member of ADAMA

AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Titular del Registro:
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
Av. EL Derby 254. Int 306. Santiago de Surco. Lima-Perú.
Telf.: (01) 641-0000

Formulador:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes No 311,
Urb. Santa Raquel 2da Etapa,
Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565,
Fax: 348-1020

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 1 Kg

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

19.5 cm

29.5 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es irritante para los ojos, la piel y el aparato respiratorio. Evite el contacto directo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Pftalimida
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.
- Su ingestión accidental produce síntomas de intoxicación como diarrea, náuseas, vómitos, debilidad muscular, hipotermia, anorexia. Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta.
- Hacer un lavado gástrico evitando la aspiración del tóxico.
- No administrar leche, aceites comestibles ni alcohol.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: Antídoto: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
Teléfono de emergencia: SAMU: 106.
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A: (01) 641-0000.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

®Marca registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: FORSEM 80 PM es un fungicida preventivo que actúa por contacto con efecto residual. Se aplica en el tratamiento de semillas y en pulverizaciones para el control de enfermedades que afectan a flores, frutos y hojas.

MODO DE EMPLEO:

ASPERSIONES FOLIARES
Aplicar **FORSEM 80 PM** previa mezcla con agua, con equipos de aspersión terrestre. No aplicar con temperaturas mayores a 30 °C.
VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 a 600 L/ha

TRATAMIENTO DE SEMILLAS
MÉTODO "SLURRY" (semilla de frijol y algodón): Espolvorear la dosis indicada de **FORSEM 80 PM** sobre la semilla previamente humedecida, remover uniformente la mezcla hasta cubrir las semillas totalmente.
MÉTODO DE INMERSIÓN (semilla de papa): Disolver 400 a 500 g de **FORSEM 80 PM** en 100 litros de agua. Sumergir los tubérculos por 2 a 3 minutos. Dejar escurrir y proceder a la siembra.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS			P.C (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	g/cil. 200 L	g/moch 20 L		
PAPA	"Hielo" "Rancha"	*Phytophthora infestans*	1.6 - 2	400 - 500	40 - 50	7	0.05
TOMATE	"Podredumbre de flores y futos"	*Botrytis cinerea*	1.5 - 2.5	400 - 500	40 - 50	7	5
CLAVEL	"Mancha negra de la hoja"	*Alternaria dianthi*	2 - 3	500 - 700	50 - 70	7	--
ARÁNDANO	"Cabeza de clavo"	*Alternaria tenuissima*	--	400 - 500	--	3	20

TRATAMIENTO DE SEMILLA

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
ALGODÓN	"Chupadera"	*Rhizoctonia solani* *Fusarium oxysporum*	5 g/kg semilla	230 g/qq semilla	(*)	--
FRIJOL			3 - 5 g/kg semilla	75 - 125 g/25 kg semilla	(*)	2
PAPA			400 - 500 g/100 L de agua/100 kg semilla		(*)	(*)

P.C.= Período de carencia / L.M.R. = Límite máximo de residuos
(*) No procede por ser tratamiento a la siembra

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Siendo el producto un fungicida de uso preventivo, realizar como máximo una sola aplicación por campaña cuando se observen los primeros síntomas ó las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.
PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina y aceites agrícolas.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados y dosis recomendadas.
RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

19.5 cm