

28.50 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 - No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Mantener los animales fuera de la zona tratada.
- PRIMEROS AUXILIOS:**
- **Grupo Químico: Ditiocarbamato.**
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión, considerar el uso de carbón activado

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- No existe antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acoplo autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los organismos acuáticos
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Utilizar una banda de protección hacia fuentes de agua no menor a 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No usar el producto en suelos arenosos



NEMISPOR[®]45SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Mancozeb..... 455 g/L
Aditivos csp 1L

Reg. PQUA N° 180 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM SAC



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 L

N° de Lote:
F. de Form.: "Ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:

SULPHUR MILLS LIMITED

249 Business 6th Floor Western Express Highway

Andheri (East) - Mumbai - 400 - 069

INDIA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NEMISPOR 45 SC es un fungicida preventivo de amplio espectro y alta efectividad que actúa por contacto contra los patógenos que atacan a los diferentes cultivos señalados en la etiqueta. NEMISPOR 45 SC tiene buen poder residual y por su tipo de formulación permite una buena cobertura y adherencia sobre el follaje.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L / 200 L	L / ha		
Alcachofa	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5 - 0.75	1.5 - 2.25	7	0.05
Cebolla	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	0.5	1.0	7	0.5
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	1.75	3.5	28	0.1
Papa	Hielo fungoso Rancho, Seca seca	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0	2.0	14	5
Pimiento	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	2.0	7	1
Tomate	Mancha negra	<i>Alternaria solani</i>	1.0	2.0	5	0.2
Vid	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.5	2.0 - 2.5	20	2

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7-10 días cuando las condiciones sean favorables al desarrollo del patógeno y cada 14 días cuando las condiciones climáticas no sean favorables para la enfermedad. Realizar máximo 3 aplicaciones/campaña en papa y 2 aplicaciones/campaña en tomate.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

15.0 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



2.2 cm

VERSIÓN 05-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 03-01-13

2002

28.50 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Mantener los animales fuera de la zona tratada.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Ditiocarbamato.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, considerar el uso de carbón activado

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- No existe antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acoplo autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los organismos acuáticos
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos
- Utilizar una banda de protección hacia fuentes de agua no menor a 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No usar el producto en suelos arenosos



NEMISPOR[®]45SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Mancozeb..... 455 g/L
Aditivos csp 1L

Reg. PQUA N° 180 - SENASA

Titular del Registro, importado y Distribuido por:
NEOAGRUM SAC

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 L

N° de Lote:
F. de Form.: "Ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:

HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou
Zhejiang Province
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NEMISPOR 45 SC es un fungicida preventivo de amplio espectro y alta efectividad que actúa por contacto contra los patógenos que atacan a los diferentes cultivos señalados en la etiqueta.

NEMISPOR 45 SC tiene buen poder residual y por su tipo de formulación permite una buena cobertura y adherencia sobre el follaje.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L / 200 L	L / ha		
Aicachofa	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5 - 0.75	1.5 - 2.25	7	0.05
Cebolla	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	0.5	1.0	7	0.5
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	1.75	3.5	28	0.1
Papa	Hielo fungoso Rancha, Seca seca	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0	2.0	14	5
Pimiento	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	2.0	7	1
Tomate	Mancha negra	<i>Alternaria solani</i>	1.0	2.0	5	0.2
Vid	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.5	2.0 - 2.5	20	2

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7-10 días cuando las condiciones sean favorables al desarrollo del patógeno y cada 14 días cuando las condiciones climáticas no sean favorables para la enfermedad. Realizar máximo 3 aplicaciones/campaña en papa y 2 aplicaciones/campaña en tomate.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



15.0 cm

— 2.2 cm —

VERSIÓN 05-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 03-01-13

0003

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reanudar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Mantener los animales fuera de la zona tratada.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarlos con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, considerar el uso de carbón activado.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOK: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- No existe antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase. Vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego insúlalo húmedando o perforándolo y depositado en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase limpio lavado al centro de accepo autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Utilizar una banda de protección hacia fuentes de agua no menor a 5 mt.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No usar el producto en suelos arenosos.

NEMISPOR 45SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Mancozeb..... 455 g/L
Aditivos c.p.a 1L

Reg. PQUA N° 180 - SENASA
Titular del Registro, importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.



Calle Cantuzas 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Formulado por
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou
Zhejiang Province
CHINA

Contenido neto: 4 L
N° de Lote:
F de Form.:
F de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NEMISPOR 45 SC es un fungicida preventivo de amplio espectro y alta efectividad que actúa por contacto contra los patógenos que atacan a los diferentes cultivos señalados en la etiqueta. NEMISPOR 45 SC tiene buen poder residual y por su tipo de formulación permite una buena cobertura y adherencia sobre el follaje.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L / 200 L	L / ha		
Alcachofa	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5 - 0.75	15 - 2.25	7	0.05
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.5	1.0	7	0.5
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	1.75	3.5	28	0.1
Papa	Hielo fungoso Rancho. Seca seca	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0	2.0	14	5
Pimiento	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	2.0	7	1
Tomate	Mancha negra	<i>Alternaria solani</i>	1.0	2.0	5	0.2
Vid	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.5	2.0 - 2.5	20	2

P.C. Período de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7-10 días cuando las condiciones sean favorables al desarrollo del patógeno y cada 14 días cuando las condiciones climáticas no sean favorables para la enfermedad. Realizar máximo 3 aplicaciones/campaña en papa y 2 aplicaciones/campaña en tomate.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Versión 05-HZ
Última revisión: 06-12-12

0004

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Mantener los animales fuera de la zona tratada.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, considerar el uso de carbón activado.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- No existe antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multiplíquela filtrándola o perforándola y deposítela en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de accepo autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Utilizar una banda de protección hacia fuentes de agua no menor a 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No usar el producto en suelos arenosos.

NEMISPOR 45SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Mancozeb..... 455 g/L
Aditivos c.p.s 1L

Reg. PQUA N° 180 - SENASA
Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEO AGRUM S.A.C.



Calle Cantuarán 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 4 L
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

Formulado por:
SULPHUR MILLS LIMITED
249 Business 6th Floor Western Express Highway
Ander (East) - Mumbai - 400-069
INDIA

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NEMISPOR 45 SC es un fungicida preventivo de amplio espectro y alta efectividad que actúa por contacto contra los patógenos que atacan a los diferentes cultivos señalados en la etiqueta. NEMISPOR 45 SC tiene buen poder residual y por su tipo de formulación permite una buena cobertura y adherencia sobre el foliaje.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L / 200 L	L / ha		
Alcachofa	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5 - 0.75	1.5 - 2.25	7	0.05
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.5	1.0	7	0.5
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	1.75	3.5	28	0.1
Papa	Hilelo fungoso Rancho, Saca seca	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0	2.0	14	5
Pimiento	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	2.0	7	1
Tomate	Mancha negra	<i>Alternaria solani</i>	1.0	2.0	5	0.2
Vid	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.5	2.0 - 2.5	20	2

P.C. Período de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones e intervalos de 7-10 días cuando las condiciones sean favorables al desarrollo del patógeno y cada 14 días cuando las condiciones climáticas no sean favorables para la enfermedad. Realizar máximo 3 aplicaciones/campaña en papa y 2 aplicaciones/campaña en tomate.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Versión 05-HZ
Última revisión: 06-12-12

5005

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Mantener los animales fuera de la zona tratada.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico:** Ditiocarbamato.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, considere el uso de carbón activado.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOK: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- No existe antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada o un sólido que se encuentre inconsciente.
- MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego múscelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Utilizar una banda de protección hacia fuentes de agua no mayor a 5 mt.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No usar el producto en suelos arenosos.



Contenido neto: 20 L
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NEMISPOR[®] 45SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Mancozeb.....455 g/L
Aditivos c.s.p.....1L

Reg. PQUA N° 180 - SENASA
Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neogrum

Calle Camarinas 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Formulado por:
SULPHAR MILLS LIMITED
29 Business 6th Floor Western Express Highway
Andher (East) - Mumbai - 400 059
INDIA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NEMISPOR 45 SC es un fungicida preventivo de amplio espectro y alta efectividad que actúa por contacto contra los patógenos que atacan a los diferentes cultivos señalados en la etiqueta. NEMISPOR 45 SC tiene buen poder residual y por su tipo de formulación permite una buena cobertura y adherencia sobre el follaje.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L / 200 L	L / ha		
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.5	1.0	7	0.5
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	1.75	3.5	28	0.1
Papa	Hielo fungoso Rancho, Seca seca	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0	2.0	14	5
Pimiento	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	2.0	7	1
Tomate	Mancha negra	<i>Alternaria solani</i>	1.0	2.0	5	0.2
Vid	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.5	2.0 - 2.5	35	2

P.C. Período de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7-10 días cuando las condiciones sean favorables al desarrollo del patógeno y cada 14 días cuando las condiciones climáticas no sean favorables para la enfermedad. Realizar máximo 3 aplicaciones/campaña en papa y 2 aplicaciones/campaña en tomate.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Versión 05-HZ
Última revisión: 06-12-12

9000

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 - No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Mantener los animales fuera de la zona tratada.
- PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo Químico: Ditiocarbamato.
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión, considerar el uso de carbón activado.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- No existe antídoto específico. Sigue tratamiento sintomático.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Después de usar el envase, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
 - Realizar rigurosamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Utilizar una banda de protección hacia fuentes de agua no menor a 5 mt.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No usar el producto en suelos arenosos.



NEMISPOR[®] 45SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Mancozeb 455 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 180 - SENASA
Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEO AGRUM S.A.C.



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou
Zhejiang Province
CHINA

Contenido neto: 20 L
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NEMISPOR 45 SC es un fungicida preventivo de amplio espectro y alta efectividad que actúa por contacto contra los patógenos que atacan a los diferentes cultivos señalados en la etiqueta. NEMISPOR 45 SC tiene buen poder residual y por su tipo de formulación permite una buena cobertura y adherencia sobre el follaje.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L / 200 L	L / ha		
Alcachofa	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5 - 0.75	1.5 - 2.25	7	0.05
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.5	1.0	7	0.5
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	1.75	3.5	28	0.1
Papa	Hielo fungoso Rancho, Seca seca	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0	2.0	14	5
Pimiento	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	2.0	7	1
Tomate	Mancha negra	<i>Alternaria solani</i>	1.0	2.0	5	0.2
Vid	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.5	2.0 - 2.5	20	2

P.C. Período de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7-10 días cuando las condiciones sean favorables al desarrollo del patógeno y cada 14 días cuando las condiciones climáticas no sean favorables para la enfermedad. Realizar máximo 3 aplicaciones/campaña en papa y 2 aplicaciones/campaña en tomate.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Versión 05-HZ
Última revisión: 06-12-12

0007