

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado. Causa irritación moderada a los ojos.
- Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto
- Puede perjudicar a determinados órganos (Sistema nervioso) por exposición prolongada o repetida.
- Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación.
- No aplicar en dirección contraria al viento.
- Uselo de sus envases originales y almacenelo herméticamente cerrado en lugares frescos y ventilados, alejado de fuentes de calor, bajo llave.
- Usar máscara, respirador, guantes protectores, pantalón y camisa de manga larga al momento de preparar el caldo de aspersión y al aplicar el producto.
- No comer, beber ni fumar durante la mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No se debe almacenar ni transportarlo conjuntamente con productos alimenticios (frescos o en conservas), bebidas, forrajes ni medicinas.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa, bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.
- No reingresar a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: **Ácido Aminofosfónico.**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de contaminación de la piel, lave inmediatamente las partes afectadas con abundante agua y jabón. Mantenga al paciente animado y caliente, al aire fresco y en posición horizontal. Lave inmediatamente los ojos contaminados con abundante agua pura durante 10 a 15 minutos. Si el producto ha sido ingerido induzca al vómito, sólo si el paciente está consciente.
- Antídoto: no existe antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
CISPROQUIM: 080050847
BASF Peruana S.A.: 513 2505

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



Basta®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICION:

Glufosinato de amonio 200 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N°183-SENASA



We create chemistry

FORMULADO POR:

Bayer S.A
Planta de Producción
km. 29.5 Carretera al Pacífico
Amatitlán - Guatemala

TITULAR DEL REGISTRO
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

BASF Peruana S.A.
Av. Q. R. Benavides 5915 – Callao
Casilla 3911, Lima 100
Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519

Contenido Neto: 1 L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- Basta® es un herbicida de contacto, no selectivo, parcialmente sistémico, que sólo puede ser absorbido vía foliar. El glufosinato de amonio inhibe la actividad de la enzima glutamintasintetasa, perturbando el metabolismo de amonio en la planta, dando como resultado una acumulación de amoníaco (NH₃) en las células de la planta, destruyéndolas. Los efectos fitotóxicos son acelerados por la luz.

- Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad en recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar. Realice la aplicación dirigida a la maleza utilizando un equipo con campana.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

MALEZAS		DOSIS		*PC (días)	**LMR (ppm)
CULTIVO	Nombre Común	Nombre Técnico	L/ha	%	L/cil 200 L
Alcañal	Yuvo hembra	Amaranthus spp.	2	-	1
Cacao	Verdolaga	Portulaca oleracea	3	0.75	1.5
Café	Caminadora	Ratiboeila exaltata	3 - 5	0.75-1.25	1.5-2.5
Caña de azúcar	Remolina	Paspalum spp.	3	-	-
	Gramma china	Sorghum halepense			
	Gramma dulce	Cynodon dactylon			
Espárrago	Gramma china	Sorghum halepense	2 - 2.5	-	1
	Herba de	Chenopodium murale			
Manzano	Coquito	Cyperus spp.	3 - 5	0.75-1.25	1.5-2.5
Narajón	Gramma china	Sorghum halepense	3 - 5	0.75-1.25	1.5-2.5
Palma aceitera	Remolina	Paspalum spp.	3 - 5	0.75-1.25	1.5-2.5
	Yuvo hembra	Amaranthus hybridus			
	Gramma china	Sorghum halepense			
	Pajilla	Chloris virgata	1.5 - 2	-	20
	Amor seco	Bidens pilosa			
	Tomatillo	Nicandra physaloides			
	Moco de pavo	Echinochloa colonum			
	Leptochloa	Leptochloa filiformis			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
Quinua	Herba gallinazo	Chenopodium murale	2	-	60
	Amor seco	Bidens pilosa			
	Herba mora	Solanum nigrum			
	Yuvo	Amaranthus viridis			
Te	Herba mora	Solanum nigrum	1 - 3	0.25-0.75	0.5-1.5
Vid	Verdolaga	Portulaca oleracea	1 - 3	0.25-0.75	0.5-1.5

* PC = Período de Carenencia **LMR = Límite Máximo de Residuos n.a= no aplica.

Nota: Las concentraciones en % están basadas en un gasto de agua promedio de 400 L de agua por ha, cuando se aplican con pulverizadora manual de mochila.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Debe aplicarse en post-emergencia, sobre malezas jóvenes de 15 a 20 cm de tamaño que tengan suficiente follaje. Se recomienda hasta dos aplicaciones por campaña. Quinua: aplicar en forma dirigida sobre malezas de 5 a 20 cm de tamaño con suficiente follaje; en plantas jóvenes de quinua de aproximadamente 30 días de edad después de la siembra.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD: Se puede aplicar en mezcla con diuron, linuron, ametrina, alaclor, metribuzina, metolaclor, atrazina, dependiendo del cultivo.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto"

