

19 cm

19 cm

23 cm

3.4 cm



INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO DISPERSABLE PARA TRATAR SEMILLAS (WS)

COMPOSICIÓN:

Thiodicarb

Imidacloprid

Aditivos

300 g/Kg

105 g/Kg

csp 1Kg

PQUA N° 300 - SENASA

INTEROC CUSTER

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.

Av. Santa Cruz 875

Oficina 300 - Miraflores

Telf.: (511) 614-5100

Lima - Perú



SINO CHEM

SINO CHEM NINGBO LTD.

Formulador:

SINO CHEM NINBO
CHEMICALS CO. LTD

21 Jiangxia St.

Ningbo Province, China

Fecha de Formulación

N° de Lote

Contenido Neto

Fecha de Vencimiento

:

:

:

:

1Kg

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO



“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

“Peligroso si es inhalado”. Evite respirar el polvo.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.

PRIMERO AUXILIOS:

Grupo Químico: Neonicotinoide + Carbamato

En caso de contacto con los ojos y piel lave con abundante agua. En caso de inhalación lleve a la víctima al aire fresco.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

Síntomas de intoxicación por IMIDACLOPRID incluyen irritación ocular y dérmica, fatiga, debilidad muscular. Tratar sintomáticamente, no hay antídoto específico.

Síntomas de intoxicación por THIODICARB incluyen malestar, debilidad muscular, mareo y sudor, dolor de cabeza, náusea, vómito, depresión del sistema nervioso central. ANTES DEL APARECIMIENTO DE LOS SÍNTOMAS.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

“Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos”.

“Peligroso para organismos acuáticos”. Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

En un recipiente diluir **CRUCIAL**® a razón de 20 gramos por cada kilogramo de semilla en máximo 2 litros de agua; a continuación, sumergir las semillas, tapar y agitar durante un minuto para asegurar una buena impregnación. Luego deje secar a la sombra durante 30 a 45 minutos para proceder a la siembra. EVITE GUARDAR SEMILLA TRATADA.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

CRUCIAL® se aplica una sola vez antes de la siembra de la semilla.

COMPATIBILIDAD:

CRUCIAL® se aplica solo.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y manejo de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
“Maíz” (<i>Zea mays</i>)	“Gusano Cogollero”	<i>Spodoptera frugiperda</i>	20 g/Kg semilla