

15 cm

15 cm



POLVO DISPERSABLE PARA TRATAR SEMILLAS (WS)

COMPOSICIÓN:

Thiodicarb	300 g/Kg
Imidacloprid	105 g/Kg
Aditivos	csp 1Kg

PQUA N° 300 - SENASA

INTEROC @ CUSTER

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú



Formulador:
**SINOCHEN NINBO
CHEMICALS CO. LTD**
21 Jiangxia St.
Ningbo Province, China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **350g**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
“**Peligroso si es inhalado**”. Evite respirar el polvo.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto cambiarse, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.

PRIMERO AUXILIOS:
Grupo Químico: Neonicotinoide + Carbamato
En caso de contacto con los ojos y piel lave con abundante agua. En caso de inhalación lleve a la víctima al aire fresco.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
Síntomas de intoxicación por IMIDACLOPRID incluyen irritación ocular y dérmica, fatiga, debilidad muscular. Tratar sintomáticamente, no hay antídoto específico.
Síntomas de intoxicación por THIODICARB incluyen malestar, debilidad muscular, mareo y sudor, dolor de cabeza, náusea, vómito, depresión del sistema nervioso central. ANTES DEL APARECIMIENTO DE LOS SÍNTOMAS.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)**
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido, inutilícelo el envase triturándolo y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. No emplear el envase para ningún otro fin.
Los envases una vez usados se deben almacenar en sitios especiales para ello; no botar en cualquier sitio, mucho menos en ríos o fuentes de agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
“Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos”.
“Peligroso para organismos acuáticos”. Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
En un recipiente diluir **CRUCIAL**® a razón de 20 gramos por cada kilogramo de semilla en máximo 2 litros de agua; a continuación, sumergir las semillas, tapar y agitar durante un minuto para asegurar una buena impregnación. Luego deje secar a la sombra durante 30 a 45 minutos para proceder a la siembra. **EVITE GUARDAR SEMILLA TRATADA.**

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:
CRUCIAL® se aplica una sola vez antes de la siembra de la semilla.

COMPATIBILIDAD:
CRUCIAL® se aplica solo.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
“El Titular de Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y manejo de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
“Maíz” (<i>Zea mays</i>)	“Gusano Cogollero”	<i>Spodoptera frugiperda</i>	20 g/Kg semilla



22 cm

3.3 cm