

20 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice la ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 08001-3040(gratuito) / 328-7398
Infosalud 0800-10828 (emergencia 24 horas)
ESSALUD: 0801-10200 CISPROQUIM: 0800-50847

- En caso de ingesta provocar el vómito, lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- Para la irritación de la piel: Tratamientos genéricos de la dermatitis. Para la irritación ocular: Pomadas o colonias oftalmológicas.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, inutilícelo triturándolo o perforándolo, y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua, no menor de 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener a los animales fuera de la zona tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No usar el producto en suelos con capa freática superficial.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SUPERZEB es un fungicida polvo mojable de amplio espectro de acción que previene e inhibe infecciones causadas por hongos en plantas al proporcionar una capa protectora a los tejidos. Para preparar el caldo de aplicación llene el recipiente con agua hasta un tercio y agregue la dosis recomendada y agite hasta lograr una suspensión homogénea. Por último complete con agua el recipiente y continúe agítándolo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar la aplicación cuando las condiciones favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días variando de acuerdo al cultivo y a la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 24 horas del tratamiento.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

SUPERZEB no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (g/cil 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Papa	Hielo fungoso o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	400 - 500	28	0.1
	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria solani</i>			
Tomate	Hielo fungoso o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	400 - 500	10	2
	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria solani</i>			
Naranja, Mandarina	Podredumbre gris / Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	400 - 500	28	2
	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria tenuis</i>			
Algodonero	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria tenuis</i>	400 - 500	28	2
Arroz	Mancha carmelita	<i>Helminthosporium oryzae</i>	400 - 500	28	0.2
	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>			
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	600 - 800	28	0.1
	Mancha foliar	<i>Puccinia asparagi</i>	600	28	0.1
Pimiento	Mancha foliar	<i>Alternaria solani</i>	750	7	2
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>			
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	600	30	2
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporoides</i>	750	14	2

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos



20 cm

SUPERZEB

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Mancozeb 800 g/kg
 Aditivos csp 1kg

Reg PQUA N° 286 - SENASA

Titular del Registro:

SHARDA PERU S.A.C

Calle Las Castañitas 138

Urb. El Palomar, San Isidro

Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:

PERU PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C.

Av Nicolás de Arriola 2374,

Urb. El Pino, San Luis, Lima

Telf (511) 547-0638

Formulado por:

SHARDA CROP CHEM LTD.

Dominic Holm. 29 th Road, Bandra (W),

Mumbai - 400 050 - INDIA.

Contenido Neto: 1 Kg

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO



INFLAMABLE



EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

30 cm

30 cm