Ø 27.94 cm
0.22
27.50 cm
0.22
0.3
0.2
14.0 cm
Adhesivos del Norte S.A.C.
0.2 cm

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**
**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: benzoylureas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste consulte con el médico.
- En caso de ingestión no inducir el vómito. No suministrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de inhalación, mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural.
- Nota al médico: no hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- **Teléfonos de Emergencias: INFOSALUD: 0800-10-828, CISPROQUIM: 080-050-847.**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# LARVIMEX 50 EC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**Composición:**

Lufenuron ..... 50 g/L
Aditivos .....c.s.p.... 1.0 L

**Reg. PQUA Nº 281-SENASA**

Titular del Registro:
**FARMEX S.A.**
Calle Dean Valdivia 148 - Piso 7
San Isidro, Lima 27 - Perú

**Formulado y Distribuido por:**

Farmex

**FARMEX S.A.**
Calle Dean Valdivia 148 - Piso 7
San Isidro, Lima 27 - Perú
Teléfono: (01) 630-6400,
Fax (01) 630-6410.
www.farmex.com.pe

Nº de lote :
Fecha de For. :
Fecha de Venc. :

**Contenido Neto:**
**1 Litro**

**INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO** **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**Larvimex 50 EC** es un insecticida selectivo, que actúa por ingestión, inhibiendo la síntesis de quitina de tal modo que las larvas son incapaces de mudar y dejan de alimentarse, provocando su muerte.

**Larvimex 50 EC** se aplica en pulverización con equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| Cultivo | Plaga | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | mL/cil | L/ha | | |
| Alcachofa | Perforador de capítulos | *Spodoptera eridania* | 150 - 250 | 0,3 - 0,5 | 7 | 0,02 |
| *Capsicum annuum* (pimientos, piquillo, páprika) | Perforador de frutos | *Heliothis virescens* | 200 - 250 | 0,4 - 0,5 | 7 | 0,3 |
| Espárrago | Masticadores de follaje | *Copitarsia incommoda*<br>*Heliothis virescens*<br>*Spodoptera eridania* | 150 - 250<br>200 - 250<br>150 - 250 | 0,3 - 0,5<br>0,4 - 0,5<br>0,3 - 0,5 | 7 | 0,02 |

L.M.R.: Límite máximo de residuos. P.P.M.: Partes por millón. P.C.: Período de carencia en días.

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIONES**

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año. El intervalo de aplicación es 14 días o más. Aplicar cuando la población de larvas se encuentre de 2 a 5 larvas por planta.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**FITOTOXICIDAD**

**Larvimex 50 EC** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

Versión 03

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

ADHESIVOS DEL NORTE

2.1 cm
0.2
0.3
0.2 cm