

Altura Total 13.5 cm.

Longitud Total 28.9 cm.

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Triazol
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Luego de una hora de ocurrido el vómito, administrar dos cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural.

NOTA AL MÉDICO: El tratamiento es sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.

Teléfono de emergencia: SAMU: 106, AGRO KLINGE S.A.: (01) 641-0000.

CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa: 956740869

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido de los envases, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole..... 250 g/L
Aditivos..... csp 1 L

Reg. PQUA N° 279-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



A member of ADAMA

AGRO KLINGE S.A.

Av. El Derby N° 254, Int. 306, Santiago de Surco, Lima - Perú.

Tel: (01) 641-0000

Fabricado y Formulado por:

Meghmani Industries Ltd.

Block N° 401, Village Chharodi, Ta.-Sanad,

Dist.- Ahmedabad-382 170, India.

Tel.: (2717) 273204, 273284

N° Lote:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

Contenido

Neto: 1 L

® Marca Registrada

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MIDAS® es un fungicida sistémico que actúa en forma preventiva y curativa en el control de la "oidiosis" en los cultivos de vid, manzano y pimiento. **MIDAS®** se emplea en pulverizaciones foliares, en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/200 L		
VID	"Oidiosis"	<i>Uncinula necator</i>	0.30-0.75	60-100	14	6
MANZANO	"Oidiosis"	<i>Podosphaera leucotricha</i>	0.30-0.75	80-100	21	1
PIMIENTO	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	0.40-0.50	200-250	7	1
ESPÁRRAGO	"Mancha púrpura" "Roya"	<i>Stemphylium vesicarium</i> <i>Puccinia asparagi</i>	----	150-200 100-150	21	0.05
ALCACHOFA	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	----	150-200	7	0.6

L.M.R.= Límite máximo de residuos / P.C.= Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por año, con un intervalo de 10 a 14 días, a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No debe mezclarse con aceites y productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm