

30.5 cm

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión.
- Moderadamente irritante al tracto respiratorio.
- Moderadamente irritante a los ojos y a la piel.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- no almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Imidazoles
- En caso de intoxicación por ingestión lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión provocar el vómito al paciente, suministrándole un vaso de agua tibia.
- No provocar vómitos, ni dar de beber líquidos a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación por inhalación, alejar al paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar fresco, seco y ventilado en posición de reposo y solicitar inmediatamente auxilio médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Solicite atención médica inmediata.
- En caso de Emergencias llamar a: CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD Telf.: 423-7600
- NOTAAL MÉDICO: No existe un tratamiento establecido, por eso es recomendable un tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No mezclar con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar estanques, ríos o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

BUCANER®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Ingrediente activo:
Prochloraz..... 450 g/L
- AditivosC.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA Nº 258 - SENASA

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERU S.A.
Av. 28 de Julio Nº 150 piso 7 - Miraflores. Lima - Perú.
Telf.: 219-3901 / Fax: 219-3929

FABRICADO Y FORMULADO POR:
SHIJIAZHANG YIHE-CHEM CO., LTD
Nº 351 Youyi Street, Shijiazhuang, China.

REENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.
Calle Marcos Farfán Nº 3459 Urb. Industrial. Independencia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERU S.A.



INFLAMABLE

© Marca Registrada

NO CORROSIVO



EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BUCANER, es un fungicida del grupo de los imidazoles, inhibidores de la síntesis de ergosterol, con acción preventiva y curativa usado para el control de la enfermedad “Tizón temprano” del tomate.

BUCANER, se puede preparar haciendo una premezcla en poca agua, luego agite bien y una vez que se disuelva el producto vierta la premezcla en el tanque de agua, cilindro o mochila según el caso y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agite constantemente y proceda a aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/200 L		
Tomate*	“Tizón temprano”	<i>Alternaria solani</i>	0.2 - 0.3	0.10 - 0.15	14	0.05
Apio*	“Cercosporiosis”	<i>Cercospora apii</i>	-	0.20 - 0.25	15	5
Melocotón*	“Roya”	<i>Tranzschelia discolor</i>	-	0.15 - 0.20	50	0.05
Mango	“Antracnosis”	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	-	0.10 - 0.15	7	5
Papa	“Tizón temprano”	<i>Alternaria solani</i>	-	0.15 - 0.20	15	0.05
Palto	“Podredumbre gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0 - 1.5	-	14	5

PC.: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

*Se recomienda un máximo de una aplicación por campaña. Cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada sin equipo de protección hasta después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BUCANER, es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD

BUCANER no es fitotóxico si se usa en las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

*El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

