

30.5 cm

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Tóxico por ingestión.
- Moderadamente irritante al tracto respiratorio.
- Moderadamente irritante a los ojos y a la piel.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- no almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Imidazoles
- En caso de intoxicación por ingestión lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión provocar el vómito al paciente, suministrándole un vaso de agua tibia.
- No provocar vómitos, ni dar de beber líquidos a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación por inhalación, alejar al paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar fresco, seco y ventilado en posición de reposo y solicitar inmediatamente auxilio médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Solicite atención médica inmediata.
- En caso de Emergencias llamar a: **CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD Telf.: 423-7600**
- **NOTA AL MÉDICO:** No existe un tratamiento establecido, por eso es recomendable un tratamiento sintomático.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No mezclar con residuos municipales.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar estanques, ríos o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

**BUCANER®**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA**

- Ingrediente activo:  
Prochloraz..... 450 g/L
- Aditivos .....c.s.p. 1 Litro

**Reg. PQUA Nº 258 - SENASA**

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERU S.A.**  
Av. 28 de Julio Nº 150 piso 7 - Miraflores. Lima - Perú.  
Telf.: 219-3901 / Fax: 219-3929

FABRICADO Y FORMULADO POR:  
SHIJIAZHANG YIHE-CHEM CO., LTD  
Nº 351 Youyi Street, Shijiazhuang, China.

REENVASADO POR: **DROKASA PERÚ S.A.**  
Calle Marcos Farfán Nº 3459 Urb. Industrial. Independencia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: **DROKASA PERU S.A.**

**CONTENIDO NETO: 1 Litro**

Número de Lote :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :



**INFLAMABLE**

© Marca Registrada

**NO CORROSIVO**



**EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**BUCANER**, es un fungicida del grupo de los imidazoles, inhibidores de la síntesis de ergosterol, con acción preventiva y curativa usado para el control de la enfermedad “Tizón temprano” del tomate.

**BUCANER**, se puede preparar haciendo una premezcla en poca agua, luego agite bien y una vez que se disuelva el producto vierta la premezcla en el tanque de agua, cilindro o mochila según el caso y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agite constantemente y proceda a aplicar.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USOS Y DOSIS**

| CULTIVO    | ENFERMEDADES               |                                       | DOSIS     |               | PC días | LMR ppm |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|---------|---------|
|            | Nombre Común               | Nombre Científico                     | L/ha      | L/200 L       |         |         |
| Tomate*    | “Tizón temprano”           | <i>Alternaria solani</i>              | 0.2 - 0.3 | 0.10 - 0.15   | 14      | 0.05    |
| Apio*      | “Cercosporiosis”           | <i>Cercospora apii</i>                | -         | 0.20 - 0.25   | 15      | 5       |
| Melocotón* | “Roya”                     | <i>Tranzchelia discolor</i>           | -         | 0.15 - 0.20   | 50      | 0.05    |
| Mango      | “Antracnosis”              | <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> | -         | 0.10 - 0.15   | 7       | 5       |
| Papa       | “Tizón temprano”           | <i>Alternaria solani</i>              | -         | 0.15 - 0.20   | 15      | 0.05    |
| Palto      | “Muerte regresiva”         | <i>Lasiodiplodia theobromae</i>       | -         | 0.100-0.125 % | 14      | 5       |
| Alcachofa  | “Tizón temprano”           | <i>Alternaria solani</i>              | -         | 0.15 - 0.20   | 71      | 0.05    |
| Cebolla    | “Alternariosis”            | <i>Alternaria porri</i>               | -         | 0.20 - 0.25   | 15      | 0.05    |
| Espárrago  | “Fusariosis del espárrago” | <i>Fusarium oxysporum</i>             | -         | 0.10 - 0.20   | 15      | 0.05    |

**PC.:** Período de carencia

**LMR:** Límite máximo de residuos.

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

\*Se recomienda un máximo de una aplicación por campaña. Cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar al área tratada sin equipo de protección hasta después de 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **BUCANER**, es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** **BUCANER** no es fitotóxico si se usa en las dosis y cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

\*El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

COD. 579689

