

21.5 CMS.

"LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas".

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta y hoja informativa adjunta".

En caso de Emergencias llamar a CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD Telf: 423-7600.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

BUCANER®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Prochloraz 450 g/L
Aditivos c.s.p 1 Litro

Reg. PQUA Nº 258 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar Nº 991 piso 9

Magdalena del Mar, Lima - Perú

Teléfono: 501-1000

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Número de Lote

Fecha de Formulación

Fecha de Vencimiento

CONTENIDO NETO: 250 ml



INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



29.5 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión.
- Moderadamente irritante al tracto respiratorio.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No alimente ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reutilice el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: imidazoles
- En caso de intoxicación por ingestión lleve al paciente al médico y muéstrela etiqueta.
- En caso de ingestión provocar el vómito al paciente suministrándole un vaso de agua tibia.
- No provocar vómitos, ni dar de beber líquidos a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación por inhalación, alejar al paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar fresco, seco y ventilado en posición de reposo y solicitar inmediatamente auxilio médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Solicite atención médica inmediata.
- En caso de Emergencias llamar a: CICOTOX Tel.: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD Tel.: 423-7600
- NOTA AL MÉDICO: No existe un tratamiento establecido, por eso es recomendable un tratamiento sintomático

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizado triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No mezclar con residuos municipales.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar estanques, ríos o arroyos con los desechos o envases vacíos
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respingar una barrera de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva

COD.

BUCANER®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Ingrediente activo: Prochloraz..... 450 g/L
- Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA Nº 258 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERU S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991 piso 9
Magdalena del Mar, Lima - Perú
Teléfono: 501-1000

FORMULADO POR:
NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.
8th Floor, No.58, Nanhui Road, Nanjing, Jiangsu, China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERU S.A.

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

© Marcas Registradas



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BUCANER, es un fungicida del grupo de los imidazoles, inhibidores de la síntesis de ergosterol, con acción preventiva y curativa usado para el control de la enfermedad "tizón temprano" del tomate.

BUCANER, se puede preparar haciendo una premezcla en poca agua, luego agite bien y una vez que se disuelva el producto vierta la premezcla en el tanque de agua, cilindro o mochila según el caso y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agite constantemente y proceda a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC LMR días ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/200 L	
Tomate*	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	0.2 - 0.3	0.10 - 0.15	14 0.05
Apio*	"Cercosporiosis"	<i>Cercospora apii</i>	-	0.20 - 0.25	15 5
Melocotón*	"Roya"	<i>Tranzschelia discolor</i>	-	0.15 - 0.20	50 0.05
Mango	"Antracnosis"	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	-	0.10 - 0.15	7 5
Papa	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	-	0.15 - 0.20	15 0.05
Palto	"Muerte regresiva"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	0.100-0.125 %	14 5
Alcachofa	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0 - 1.5	-	14 5
Cebolla	"Alternariosis"	<i>Alternaria solani</i>	-	0.15 - 0.20	71 0.05
Espárrago	"Fusariosis del espárrago"	<i>Fusarium oxysporum</i>	-	0.20 - 0.25	15 0.05
Mandarina	"Moho verde"	<i>Penicillium digitatum</i>	-	0.10 - 0.20	15 0.05
			-	0.15 - 0.20	8 10

LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

*Se recomienda un máximo de una aplicación por campaña. Cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO No reingresar al área tratada sin equipo de protección hasta después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD BUCANER es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD BUCANER no es fitotóxica si se usa en las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

15 cm

000020

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión.
- Moderadamente irritante al tracto respiratorio.
- Nociva, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No alimente ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Imidazoles
- En caso de intoxicación por ingestión lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión provocar el vómito al paciente, suministrándole un vaso de agua tibia.
- No provocar vómitos, ni dar de beber líquidos a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación por inhalación, alejar al paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar fresco, seco y ventilado en posición de reposo y solicitar inmediatamente auxilio médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Solicite atención médica inmediata.
- En caso de Emergencias llamar a: CICOTOX Tel.: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD Tel.: 423-7600
- NOTAAL MÉDICO: No existe un tratamiento establecido, por eso es recomendable un tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego infúndalo tirándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No mezclar con residuos municipales.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar estanques, ríos o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



BUCANER®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Ingrediente activo: Prochloraz 450 g/L
- Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA Nº 258 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERU S.A.
 Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena del Mar
 Tel.: 501-1000 / Fax: 262-8403

FORMULADO POR:
 NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.
 9th Floor, No.58, Nanhu Road, Nanjing, Jiangsu, China



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERU S.A.

CONTENIDO NETO: 200 Litros

Número de Lot:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:



INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BUCANER, es un fungicida del grupo de los imidazoles, inhibidores de la síntesis de ergosterol, con acción preventiva y curativa usado para el control de la enfermedad "Tizón temprano" del tomate.

BUCANER, se puede preparar haciendo una premaza en poca agua, luego agite bien y una vez que se disuelva el producto vierta la premaza en el tanque de agua, cilindro o mochila según el caso y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agite constantemente y proceda a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC días
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/200 L	
Tomate*	"Tizón temprano"	Alternaria solani	0.2 - 0.3	0.10 - 0.15	14
Apio*	"Cercosporiosis"	Cercospora apii	-	0.20 - 0.25	15
Melocotón*	"Roya"	Tranzschella discolor	-	0.15 - 0.20	50
Mango	"Antracnosis"	Colletotrichum gloeosporioides	-	0.10 - 0.15	7
Papa	"Tizón temprano"	Alternaria solani	-	0.15 - 0.20	15
Patato	"Muerte regresiva"	Lasiodiplodia theobromae	-	0.100 - 0.125 %	14
	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	1.0 - 1.5	-	14
Acachofa	"Tizón temprano"	Alternaria solani	-	0.15 - 0.20	71
Cebolla	"Alternariosis"	Alternaria porri	-	0.20 - 0.25	15
Espárrago	"Fusariosis del espárrago"	Fusarium oxysporum	-	0.10 - 0.20	15
Mandarinal	"Moho verde"	Pericillium digitatum	-	0.15 - 0.20	8

PC: Período de curación

Litro: Litro mínimo de residuo.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda un máximo de una aplicación por campaña. Cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada sin equipo de protección hasta después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BUCANER, es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD

BUCANER no es fitotóxico si se usa en las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, al ser usado y manejado de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



000022

- Peligro para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o orines vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derame recoger el producto depositando en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.