

LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35 °C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón

PRIMEROS AUXILIOS

- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- Causa irritación a la piel e irritación moderada a los ojos.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico, aplicar terapia sintomática.
- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 080013040 ó CISPQUIM: 080050847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- No disponer con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flores silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ENGEO®

INSECTICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada - SC

Composición

Thiametoxam..... 141 g/L
Lambdacialotrina.....106 g/L
Aditivos c.s.p..... 1 Litro

Reg. PQUA N° 0278 – SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
René Descartes 170, Urb. Santa Raquel, II etapa, Ate Vitarte, Lima - Perú
RUC 20501511740
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por:

TECNOLOGIA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.
Separadora Industrial Mz."E" Lote 12
Urb.Sta.Raquel 2da Etapa Ate. Lima
Telf: 348-1103 Fax:348-1020
RUC : 20307150981

Formulado por:

Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
Rodovia SP 332 Km 130
CEP. 13140-000
Paulínia - SP
Brasil

Contenido Neto: 1 Litro

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

Los nombres de producto que contengan ® o ™
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas controladas de una Compañía del Grupo Syngenta

syngenta®

INDICACIONES GENERALES

- ENGEO® es un nuevo insecticida sistémico que contiene dos ingredientes activos: thiametoxam y lambdacialotrina.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Para la preparación, adicionar la cantidad de ENGEO® a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádale al último y vuelva a agitar.

- ENGEO® puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizador manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia tipo cono vacío).

- ENGEO® puede ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas, sobre todo en la zona donde se encuentran los insectos a controlar.

- Para obtener un flujo de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación.

CUADRO DE USOS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS				
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS mL/200 L agua	P.C (días)	LMR (ppm)
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotypes suturicallus</i> <i>Premnotypes lathithorax</i>	250	14	*0.02/**0.1
Algodón	Arrebiatado Mosca blanca	<i>Dysdercus peruvianus</i> <i>Bemisia tabaci</i>	125 100 - 150	N.A.	*0.2/**0.05
Arroz	Gusano rojo	<i>Chironomus xanthus</i>	50 - 75	35	*1.0/**0.05
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	100 - 125	30	* 0.02/**0.05
Palto	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	75 - 100	90	* 0.02/**0.05
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i> (Biotype b)	150 - 200	0	* 0.1/**0.2

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
N.A.: No aplica *L.M.R.: Lamda-cyhalothrin ** L.M.R.: Thiamethoxam

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

En el cultivo de papa, aplicar ENGEO® cuando se observen los primeros adultos del gorgojo de los andes.

Realizar como maximo una aplicación de ENGEO® por campaña por año.

En el cultivo de arroz, realizar una única aplicación de ENGEO® a los 15 - 20 días después del transplante.

Para el cultivo de algodón, realizar una única aplicación de ENGEO® cuando se observen presencia de ninfas y fomatión de bellotas.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas

COMPATIBILIDAD

ENGEO® puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados.

FITOTOXICIDAD

ENGEO® no ha causado fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

