

LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35 °C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón

PRIMEROS AUXILIOS

- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- Causa irritación a la piel e irritación moderada a los ojos.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico, aplicar terapia sintomática.
- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 080013040 ó CISPROQUIM: 080050847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- No disponer con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flores silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ENGEO®

INSECTICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada - SC

Composición

Thiamethoxam..... 141 g/L  
Lamda-cyhalothrin.....106 g/L  
Aditivos c.s.p..... 1 Litro

Reg. PQUA N° 0278 – SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú  
René Descartes 170, Urb. Santa Raquel, II etapa, Ate Vitarte, Lima - Perú  
RUC 20501511740  
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por:

TECNOLOGIA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.  
Separadora Industrial Mz. "E" Lote 12  
Urb. Sta. Raquel 2da. Etapa Ate. Lima  
Telf: 348-1103 Fax: 348-1020  
RUC : 20307150981

Formulado por:

Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.  
Rodovia SP 332 Km 130  
CEP. 13140-000  
Paulínia - SP  
Brasil

Contenido Neto: 1 Litro

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

Los nombres de producto que contengan ® o ™  
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME  
Son marcas controladas de una Compañía del Grupo Syngenta

syngenta®

INDICACIONES GENERALES

- ENGEO® es un nuevo insecticida sistémico que contiene dos ingredientes activos: thiametoxam y lambdacihalotrina.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Para la preparación, adicionar la cantidad de ENGEO® a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añáddalo al último y vuelva a agitar.

ENGEO® puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizador manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia tipo cono vacío).

ENGEO® puede ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas, sobre todo en la zona donde se encuentran los insectos a controlar.

Para obtener un flujo de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

| CULTIVO | PLAGAS               |                                                  |                     |            |              |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
|         | NOMBRE COMUN         | NOMBRE CIENTIFICO                                | DOSIS mL/200 L agua | P.C (días) | LMR (ppm)    |
| Papa    | Gorgojo de los Andes | Premnotypes suturalis<br>Premnotypes lathithorax | 250                 | 14         | *0.1/**0.02  |
|         | Arrebiatado          | Dysdercus peruvianus                             | 125                 | N.A.       | *1.0/**0.05  |
| Algodón | Mosca blanca         | Bemisia tabaci                                   | 100 - 150           |            |              |
|         | Chinche              | Oebalus spp.                                     | 75 - 100            | 30         | *0.05/**0.02 |
|         | Gusano rojo          | Chironomus xanthus                               | 50 - 75             |            |              |
|         | Sogata               | Tagosodes oryzicola                              | 100                 |            |              |

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

N.A.: No aplica \*Thiamethoxam \*\*Lamda-cyhalothrin

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

En el cultivo de papa, aplicar ENGEO® cuando se observen los primeros adultos del gorgojo de los andes.

Realizar como maximo una aplicación de ENGEO® por campaña por año.

En el cultivo de arroz, realizar una única aplicación de ENGEO® a los 15 - 20 días después del transplante.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas

COMPATIBILIDAD

ENGEO® puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados.

FITOTOXICIDAD

ENGEO® no ha causado fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

