

LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35 °C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar a la área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Thiamethoxam:Neonicotinoides
Lambda-Cyhalothrin. Piretroides
 - Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
 - Causa irritación a la piel e irritación moderada a los ojos.
 - En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
 - Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
 - En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
 - En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
 - Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
 - No hay antídoto específico, aplicar terapia sintomática.
 - En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 080013040 ó CISPQUIM: 080050847.
- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flores silvestre, no permitir animales en la área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ENGEO®

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

Composición

Thiamethoxam 141 g/L
Lambda-Cyhalothrin 106 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 0278 – SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
René Descartes 170, Urb. Santa Raquel, II etapa, Ate Vitarte, Lima - Perú
RUC 20501511740
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por:

TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.
Separadora Industrial Mz. "E" Lote 12
Urb. Sta. Raquel 2da. Etapa Ate. Lima
Telf: 348-1103 Fax: 348-1020
RUC: 20307150981

Formulado por:

Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
Rodovia SP 332 Km 130
CEP. 13140-000
Paulinia - SP
Brasil

Contenido Neto: 1 Litro

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Los nombres de producto que contienen ® son ™.
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

syngenta®

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- ENGEO® es un nuevo insecticida sistémico que contiene dos ingredientes activos: thiametoxam y lambdacyhalotrina.
- Para la preparación, adicionar la cantidad de ENGEO® a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo al último y vuelva a agitar.
- ENGEO® puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizador manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia tipo cono vacío).
- ENGEO® puede ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas, sobre todo en la zona donde se encuentran los insectos a controlar.
- Para obtener un flujo de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación.

CUADRO DE USOS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	PLAGAS		
			DOSIS mL/200 L. agua	P.C. (días)	LMR (ppm)
Algodón	arrebatiado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	125	28	*0.05/**0.05
	mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150		
	picudo	<i>Anthonomus vestitus</i>	150 - 200		
Arroz	chinche	<i>Oebalus spp.</i>	75 - 100	21	*0.05/**0.02
	gusano rojo	<i>Chironomus xanthus</i>	50 - 75		
	sogata	<i>Tagosodes orizicolus</i>	200-250		
	mosca minadora	<i>Hydrellia wirthi</i>	100 - 150		
Cebolla	trips	<i>Thrips tabaci</i>	100 - 125	30	*0.05/**0.02
Papa	gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes sp.</i>	250	14	*0.1/**0.02
	pulgilla	<i>Epitrix spp.</i>	75		
Palto	trips	<i>Thrips tabaci</i>	75 - 100	90	*0.05/**0.02
Pimiento	mosquilla	<i>Prodioplosis longifila</i>	100 - 125	45	*0.5/**0.1
Tomate	mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	150 - 200	0	*0.01/**0.2

P.C.: Periodo de Carenia L.M.R.: Limite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

*Thiamethoxam **Lambdacyhalothrina

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- En el cultivo de papa, aplicar ENGEO® cuando se observen los primeros adultos del gorgojo de los andes.

- Realizar como máximo una aplicación por campaña por año

PERIODO DE REINGRESO

- 24 horas.

COMPATIBILIDAD

- ENGEO® puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados.

FITOTOXICIDAD

ENGEO® no ha causado fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

