

ARIMEC 1.8 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICION QUIMICA:

Abamectina 18 g/l
Aditivos.....csp 1 litro

Registro PQA N° 266 – SENASA

Titular del Registro: ARIS INDUSTRIAL S. A.



FORMULADO POR:

ARIS INDUSTRIAL S. A

Av. Industrial 491, Lima. Perú.
Telf.: 336 5428

DISTRIBUIDO POR:

FITOCORP SAC

Calle Los Tejedores 187. Urb.
Vulcano
Telf. 713-0556



NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE

NO CORROSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento
- No utilizar el producto en ambientes cerrados como invernaderos, almacenes, etc.
- Ningún envase que halla contenido plaguicidas debe rehusarse.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELEFONO DE EMERGENCIA: SAN MIGUEL INDUSTRIAL S. A. (01) 336 5428
CICOTOX (01) 328 7398 y ALO ESSALUD (01) 472 2300 (Las 24 Horas)

RECOMENDACIONES PARA EL MEDICO.

- No existe antídoto específico.
- En caso de intoxicación el médico deberá instituir tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar de destino por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe rehusarse.
- No disponer con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

- Muy peligroso para las abejas. Nocivo para la fauna benéfica.
- **No aplicar en época de floración.**
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Respetar anda de protección de al menos 5 m. hacia fuentes de agua.

CARACTERISTICAS

ARIMEC 1.8 EC es un insecticida-acaricida sistémico de amplio espectro y de actividad traslaminar para el control de diversas plagas agrícolas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Aplicar **ARIMEC 1.8 EC** con los equipos de aplicación convencional.
- Realizar una premezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

Cultivos	PLAGAS		Dosis ml/200 l	PC (días)	LMR ppm
	Nombre científico	Nombre Común			
Ají	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Acaro hialino	100-150	7	0.01
Mandarina	<i>Phyllocnistis citrella</i>	Minador de cítricos	100-125	7	0.01

PC: Periodo de carencia
LMR : Límite máximo de residuos expresados en ppm.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda máximo 4 aplicaciones por año en mandarina y máximo 1 aplicación en ají/ campaña

PERIODO DE REINGRESO

No entre en las áreas tratadas después de las 24 horas de la aplicación

COMPATIBILIDAD

ARIMEC 1.8 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de la marcada reacción alcalina. Siempre se recomienda hacer una pre-mezcla.

FITOTOXICIDAD

ARIMEC 1.8 EC no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

