

ARMHYL 90 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN:

Methomyl.....900 g/Kg

Aditivos.....c.s.p. 1 Kg

Registro PQUA N° 268-SENASA

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Titular del Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.

Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China

Oficina Central: 21 Jiangxia St., 315000 Ningbo, China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336-5428

Fecha de Formulación :
No de Lote :
Contenido Neto : 1 Kg
Fecha de Vencimiento :

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Durante el manipuleo y aplicación usar ropa, máscara y guantes protectores.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Mantenga este producto en lugar seco, alejado de fuentes de calor y su empaque en perfectas condiciones.
- No transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas de uso humano o animal.
- Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto.
- No aplicar en dirección contraria al viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carbamatos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa conseguir ayuda médica inmediatamente. Si no respira, realizar respiración artificial. Mantener a la persona en reposo y abrigada.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua y jabón y enjuagar. Lavar las ropas contaminadas antes de reutilizarlas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar los ojos inmediatamente con abundante cantidad de agua durante por lo menos 15 minutos.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua. No administrar nada por la boca ni inducir el vómito si la persona está inconsciente.
- Tratamiento sintomático: Antídoto Sulfato de Atropina. Aplicar vía intramuscular, en dosis de 1 a 2mg cada 10 minutos, hasta que se obtenga la completa atropinización.
- En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428
CICOTOX: 0800-13040 CIPROSQUIM: 0800-50847 ESSALUD: 117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces, no contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar en suelos con napa freática superficial.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ARMHYL 90 SP es un insecticida del grupo de los Carbamatos, que actúa por contacto directo o mediante la actividad sistémica ascendente y la actividad transaminar de las plantas tratadas. Su modo de acción es inhibir la acción de la enzima acetilcolinesterasa (ACE). Con la acumulación de la AC se altera el funcionamiento normal de las fibras nerviosas de los insectos.

Aplicar ARMHYL 90 SP en mezcla con un volumen suficiente de agua uniformemente sobre el follaje de las plantas. Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		Dosis (Kg/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2	3	0.05
	Heliothis	<i>Heliothis virescens</i>	0.15	1	
Palto	Queresa del palto	<i>Florinia florinae</i>	0.1 - 0.15	1	0.02
Alcachofa	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2 - 0.25	7	0.02
Pimiento	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	3	0.02

PC: Periodo de Carencia en días.

LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deben basarse en evaluaciones hechas en campo, teniendo en cuenta el nivel de daño económico y la densidad de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas durante 72 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ARMHYL 90 SP es incompatible con bases fuertes. Es recomendable, hacer previamente pruebas de compatibilidad en mezcla con nuevos grupos químicos de plaguicidas.

FITOTOXICIDAD

ARMHYL 90 SP no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

