

PRE DOSTAR®

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE (WP)

Composición Química:

Propamocarb Hydrochloride.....	100 g/kg
Metalaxyl	150 g/kg
Aditivos c.s.p.....	1.0 Kg

Reg. PQUA N° 276 - SENASA

Lote No:
Fecha de Elaboración:
Fecha de vencimiento:

CONTENIDO NETO: 1 Kg

INTEROC @ CUSTER

JBC

TITULAR DE REGISTRO,
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
INTEROC S.A.

Av. La Molina N° 2830. Tda. B 17/2,
Mz D. Lt. 02, Urb. El Sauce de
La Rinconada. Lima - Perú

FORMULADO POR:
**JIANGSU BAOLING
CHEMICAL CO., LTD**
41 Yaogang Road, Nantong
Jiangsu, Nanjing-China

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUSIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Causa irritación moderada al tracto respiratorio, moderadamente peligroso si es inhalado, evitar respirar el polvo de la aspersión en la mezcla y aplicación. Moderadamente irritante a los ojos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas de aplicado el producto. No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos y bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS: Grupo Químico: Propamocarb hydrochloride (carbamato) y Metalaxyl (acylalanina).

En caso de intoxicación por inhalación, remover al individuo para que respire aire fresco, dar respiración artificial si es necesario. Llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta. **En caso de intoxicación por ingestión** no induzca al vómito. No de nada de beber a personas en estado de inconsciencia. Llevar al paciente inmediatamente al médico. **En caso de contacto con la piel o ropa,** lavar con abundante agua y jabón, remover la ropa contaminada y lavarla después de usarla. **En caso de contacto con los ojos,** lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos y consulte a un médico especialista (oftalmólogo). **NOTA AL MÉDICO:** El tratamiento es sintomático. No existe antídoto específico para metalaxyl y propamocarb hydrochloride. Se prohíbe el consumo de alcohol, grasas y aceites. Para emergencias comuníquese a : CICOTOX (LINEA GRATUITA) 0800-1-3040. Mayor información llamar a INTEROC S.A (511) 243-2233.

CONDICIONES DE MANEJO Y ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS: Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin. No emplear el envase para ningún otro fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE: Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos o estanques con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y USO: PREDOSTAR es un fungicida sistémico de acción protectante y curativa, usado para el control de enfermedades en tomate, cebolla y papa. Para la preparación de la mezcla, colocar la mitad del agua en el cilindro o tanque de aplicación, adicione la cantidad recomendada de **PREDOSTAR** y agite. Adicione el resto de agua. Aplicar durante las primeras horas de la mañana o últimas de la tarde para evitar que el viento arrastre la aspersión a zonas diferentes de la zona de aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Enfermedad		Dosis		LMR (ppm)		PC (días)
	Nombre común	Nombre científico	g/ha.	g/cil.	Propamocarb hydrochloride	Metalaxyl	
Tomate	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	500	250	2	0.5	14
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	-	250 a 300	0.1	2	14
Papa	Hielo, Rancha ó Seca seca	<i>Phytophthora infestans</i>	-	250 a 300	0.3	0.05	14

LMR : Límite máximo de residuos

PC : Período de carencia

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN: Realizar máximo una aplicación por campaña por año, cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o cuando la enfermedad este presente.

PERIODO DE REINGRESO: Ingresar con ropa protectora durante las primeras 24 horas luego de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con la mayoría de agroquímicos existentes en el mercado. No mezclar con productos de reacción fuertemente alcalina como sulfato de calcio, sulfato de cobre. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar las mezclas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

