

15 cm

15 cm

PRE DOSTAR®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Propamocarb Hydrochloride 100 g/Kg
Metalaxyl 150 g/Kg
Aditivos csp 1 Kg

PQUA N° 276 - SENASA

INTEROC @ CUSTER

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.

Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Fabricante y Formulador:
SINOCHEM NINGBO LTD.

21 Jiangxia ST.,
Ningbo 615000
China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **300 g**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Causa irritación moderada al tracto respiratorio, moderadamente peligroso si es inhalado, evitar respirar el polvo de la aspersión en la mezcla y aplicación. Moderadamente irritante a los ojos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas de aplicado el producto. No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos y bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Procarnocarb hydrochloride (carbamato) y Metalaxyl (acylalanina).

En caso de intoxicación por inhalación, remover al individuo para que respire aire fresco, dar respiración artificial si es necesario. Llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de intoxicación por ingestión, no induzca al vómito. No de nada de beber a personas en estado de inconsciencia. Llevar al paciente inmediatamente al médico.

En caso de contacto con la piel o ropa, lavar con abundante agua y jabón, remover la ropa contaminada y lavarla después de usarla.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos y consulte a un médico especialista (oftalmólogo). NOTA AL MÉDICO: El tratamiento es sintomático. No existe antídoto específico para metalaxyl y propamocarb hydrochloride. Se prohíbe el consumo de alcohol, grasas y aceites.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX (LINEA GRATUITA) 0800-1-3040. Para mayor información
llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos o estanques con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PREDOSTAR® es un fungicida sistémico de acción protectante y curativa, usado para el control de enfermedades en tomate, cebolla y papa. Para la preparación de la mezcla, colocar la mitad del agua en el cilindro o tanque de aplicación, adicione la cantidad recomendada de **PREDOSTAR®** y agite. Adicione el resto de agua. Aplicar durante las primeras horas de la mañana o últimas de la tarde para evitar que el viento arrastre la aspersión a zonas diferentes de la zona de aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar máximo una aplicación por campaña por año, cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o cuando la enfermedad este presente.

PERIODO DE REINGRESO:

Ingresar con ropa protectora durante las primeras 24 horas luego de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

El producto es compatible con la mayoría de agroquímicos existentes en el mercado. No mezclar con productos de reacción fuertemente alcalina como sulfato de calcio, sulfato de cobre. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar las mezclas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		LMR (ppm)		PC (días)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/Ha	g/cil de 200L	Propamocarb hydrochloride	Metalaxyl	
Tomate	“Rancha”	<i>Phytophthora infestans</i>	500	250	2	0.5	14
Cebolla	“Mildiu”	<i>Peronospora destructor</i>	-	250 - 300	0.1	2	14
Papa	“Hielo”, “Rancha” ó “Seca seca”	<i>Phytophthora infestans</i>	-	250 - 300	0.3	0.05	11
Sandía	“Mildiu”	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	-	300	5	0.2	7

PC: Periodo de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos



22 cm

3.3 cm