

Etiqueta SEXTAN 500 SC COEX para 1L

17.08.10

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- CUIDADO, EVITE EL CONTACTO. POSIBLE CARCINOGENO.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzimidazoles.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX 0-800-1-3040

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

SEXTAN[®] 500SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión concentrada (SC)

Composición Química:

Carbendazim..... 500 g/L
Aditivos 500 g/L

Registro PQUA N° 314 - SENASA

Contenido Neto: 1Lt
Fecha de Form:
Fecha de Venc:
N° de Lote:

Importador y Titular de Registro:

PINERAL ANDINA S.A.
Av. Flora Tristán 463 Of. 201
Urbanización Santa Patricia II Etapa.
La Molina. Lima- Perú
Tel: (01) 348 -1018 / 349 - 9609.

Formulado por:

Point Agro-China Limited
Room 1505-1506 Diamond Business Centre
Nanxing Street, Shangcheng District
Hangzhou 310008, China
Tel.: +86(0)571-86959101 Fax: +86(0)571-28007617

Distribuido por:

FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
Teléfono: 614-1500 Fax: 614-1517

FARMAGRO S.A.
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

• **SEXTAN 500SC** es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Actúa sobre la división celular (mitosis de los hongos), básicamente sobre los microtúbulos, lo que causa que se detenga el crecimiento de estos patógenos.

• **SEXTAN 500SC** se emplea diluido en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

• **SEXTAN 500SC** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo de la plaga.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS mL/Cil - 200 L	Periodo de Carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
VID	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300	7	3
AJI PAPRIKA	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300	7	5
TOMATE	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300	7	0,5
ARROZ	Quemado del arroz	<i>Pyricularia oryzae</i>	300	8	2
PIMIENTO	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	300	3	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

SEXTAN 500 SC puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo. Puede repetirse la aplicación después de 20 días. Número máximo de aplicaciones: 2 aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

SEXTAN 500SC es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se han reportado problemas de fitotoxidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

