



27.5 cms.

Pag1

**LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Evitar la ingestión del producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Evitar la inhalación de vapores. No inhalar la nube de aspersión. El producto contiene hidrocarburos aromáticos.
- Puede producir irritación a los ojos y a la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel y los ojos. Riesgo de daño serio a los ojos.
- Puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazoles.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a: CICOTOX: 080013040, CISPROQUIM: 080050847, ESSALUD en línea: 0801-10200 opción 4 y Emergencias Químicas Bomberos (117). Nota al médico: Lavado gástrico.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio mucho en los ríos.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Score[®] 250 EC

FUNGICIDA AGRICOLA

Concentración Emulsionable - EC

Composición

Difenoconazol 250 g/L
Aditivos c.s.p 1 Litro

Reg. PQUA N° 326 – SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú
René Descartes 170 Urb. Santa Raquel II etapa Ate Vitarte, Lima
RUC 20501511740

Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por:



TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Sede Operativa Industrial Mz. "E" Lote 12
Urb. Sta Raquel 2da. Etapa Ate Lima
Telf: 348-1103 Fax: 348-1020
RUC: 20027150871

Formulado por:

Syngenta S.A.
Cartagena, Colombia

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



Los nombres de producto que contienen ® o TM,
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

1 Litro

syngenta[®]

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES USO Y MANEJO

Score[®] 250 EC, es un fungicida sistémico y translaminar de acción preventiva y curativa usado para el control de enfermedades foliares causadas por hongos en diversos cultivos.

FRECUENCIA ÉPOCA DE APLICACIÓN

Score[®] 250 EC debe ser aplicado previamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña por año.

El intervalo de aplicación puede variar entre 7 y 14 días. Sin embargo este intervalo puede reducirse o incrementarse dependiendo de la presión de la enfermedad y de las condiciones ambientales para el desarrollo de la misma.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada antes de las 48 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Score[®] 250 EC puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD

Score[®] 250 EC, a la dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad en ninguna de las etapas de crecimiento de los cultivos. Para el caso de clavel y rosas, debido al gran número de variedades que existen, se recomienda en caso de duda y sobre todo para variedades nuevas, hacer un ensayo en pequeña escala para observar la fitocompatibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

DESPRENDA AQUÍ

15 cms.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Durante la mezcla: Utilizar delantal de goma, tapaboca, careta de protección y guantes de nitrilo o neopreno.
- Durante la aplicación: Utilizar sombrero, overol de algodón, tapaboca, botas de goma y guantes de nitrilo o neopreno.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Evitar la ingestión del producto.
- Puede producir irritación a los ojos y a la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel y los ojos. Riesgo de daño serio a los ojos.
- Evitar la inhalación de vapores.
- No inhalar la nube de aspersión.

INSTRUCCIONES PARA UN BUEN ALMACENAMIENTO

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar en casas de habitación.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor. Evitar almacenar el producto a temperaturas menores a -10°C ó superiores a 35°C .

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: CICOTOX: 080013040 O CISPROQUIM: 080050847.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido!, aplicar terapia sintomática.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.

- No contaminar fuentes de agua, lagos, nos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.

- En caso de derrame colocar sobre el producto un material absorbente como aserrín o arena, recogerlo y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

RECOMENDACIONES PARA LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Lavar completamente el equipo de aplicación con agua limpia.
- Cuando se tenga disponibilidad, usar una manguera a presión para limpiar el interior del equipo. Poner a funcionar el equipo y recircular completamente el agua por un periodo de 15 minutos. Todos los depósitos visibles deben ser removidos del equipo de aplicación.
- Eliminar los desechos de una manera apropiada. Aplicar la solución limpiadora sobre cultivos no tratados o regresarlos al tanque de mezcla para un uso posterior en el cultivo o para poder eliminarlos de manera segura



e) Repetir los pasos b) al d) tres veces

f) Retirar las boquillas y filtros y limpiarlos separadamente luego de realizar los procedimientos antes mencionados.

INDICACIONES GENERALES

- **Score 250 EC** es un fungicida que pertenece al grupo de los triazoles, inhibidores de la síntesis de ergosterol.
- **Score 250 EC** posee acción sistémica y de translaminar que le permite controlar las enfermedades fungosas de manera tanto preventiva como curativa.

MODO DE EMPLEO

- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Antes de utilizar el producto agite bien el envase.
- Para la preparación, echar la cantidad de **Score 250 EC** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una emulsión estable y completar la cantidad de agua.
- En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo de último y vuelva a agitar.
- **Score 250 EC** puede ser aplicado con pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).
- Aun cuando **Score 250 EC** es un fungicida sistémico, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.
- Este volumen de agua por hectárea puede variar entre 200 litros con plantas al inicio de su desarrollo o con poco follaje hasta 600 litros, como mínimo, en plantas bien desarrolladas o de mucho follaje.
- Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador.

PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al área tratada antes de las 48 horas posteriores a la aplicación.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- Para obtener un control óptimo y económico **Score 250 EC** debe ser aplicado preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
- El intervalo de aplicación puede variar entre 7 y 14 días. Sin embargo, este intervalo puede reducirse o incrementarse dependiendo de la presión de la enfermedad y de las condiciones ambientales para el desarrollo de la misma.
- Para evitar la aparición de resistencia, se recomienda no aplicar **Score 250 EC** más de dos veces por campaña, rotándolo siempre con productos de diferente modo de acción.

COMPATIBILIDAD

- En principio **Score 250 EC** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados.
- En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD

- **Score 250 EC**, a la dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad en ninguna de las etapas de crecimiento de los cultivos. Para el caso de clavel y rosas, debido al gran número de variedades que existen, se recomienda en caso de duda y sobre todo para variedades nuevas, hacer un ensayo en pequeña escala para observar fitocompatibilidad.
- En la práctica no se han observado efectos negativos sobre otros cultivos diferentes a los aquí recomendados ni sobre algún cultivo sembrado con posterioridad a aquel donde se aplicó **Score 250 EC**.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	mL / ha	mL / 200mL		
Aji pprika	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	250 - 375	100 - 150	15	0.05
	Alternariosis	<i>Alternaria spp.</i>	300 - 375	200 - 250	3	0.05
Ajo	Alternaria	<i>Alternaria porri</i>		150 - 200	7	0.05
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	250 - 375	100 - 150	ND	2.0
Apio	Mancha foliar	<i>Cercospora apiicola</i>		150 - 200	21	0.05
Arveja	Oidium	<i>Erysiphe betae</i>		150 - 200	14	0.05
Arroz	Quemado del arroz	<i>Pyricularia grisea</i>	200 - 300		25	0.05
	Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	200 - 300		25	0.05
Cebolla	Alternaria	<i>Alternaria porri</i>		150 - 200	7	0.05
	Tizn foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>		200 - 250	7	
Clavel	Roya	<i>Uromyces dianthi</i>		200 - 300	NA	20
Col	Oidium	<i>Erysiphe polygoni</i>		150 - 200	21	0.2
Granada	Alternaria	<i>Alternaria alternata</i>	500 - 600		ND	0.1
Esprrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	350 - 500		30	0.05
	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>				
	Mancha purpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>		150 - 250		
Frijol	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>		150 - 200	14	0.05
	Oidium	<i>Erysiphe polygoni</i>		150 - 200		
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>		125	14	0.1
Manzano	Oidium	<i>Podosphaera leucotricha</i>		80	14	0.5
Marigold	Alternaria	<i>Alternaria sp.</i>		150 - 200	30	20
Meln	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>		150 - 200	7	0.05
Rosa	Oidium	<i>Sphaeroteca pannosa v. rosae</i>		200 - 300	NA	20
Sanda	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>		150 - 200	7	0.05
Tomate	Alternaria	<i>Alternaria solani</i>		150 - 200	7	2.0
Vainita	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>		150 - 200	14	0.05
	Oidium	<i>Erysiphe polygoni</i>				
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>		50 - 100 (1) 150 - 200 (2)	28	0.5
Zapallo	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>		150 - 200	7	0.05
Granada	Alternaria	<i>Alternaria Alternata</i>	500 - 600		ND	0.1

(1) En variedades sin pepa (2) En variedades con pepa

PC: Perodo de Carencia LMR: Lmite Mximo de Residuos ND: No Determinado NA: No aplica