

Tamaño: 16 x 12 cms

11.12.2017

NEMIZEB® 800 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Maconzeb..... 800.00 g/kg
Aditivos 200.00 g/kg

PQUA N° 348 - SENASA

Titular Del Registro: SERFI S.A.

Formulador:



SINOCHEN NINGBO LTD.
N°599 Jiangnan Road,
Science and Technology park,
Ningbo, Zhejiang, China.

Importado y Distribuido por:



Av. Oscar R. Benavides (ex-Diagonal)
N° 380 Of. 701, Miraflores Lima - Perú
Teléfono: 51(1) 446-2886

Lote N° :
Fecha de Form. :
Fecha de Vcto. :

CONTENIDO NETO: 1 kg

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni ferrejes.
 - No reenvasar el contenido en otros envases ni reutilizarlos.
 - Realice la aplicación en la dirección del viento.
 - El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas sensibles.
 - El producto no puede ser usado por personas que tengan problemas de frías o estén bajo tratamientos de infecciones virales.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Dificultad respiratoria
- En caso de irritación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta o su copia.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca durante 15 minutos y si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión si el paciente está consciente, provoque el vómito, lávelo guiso, purgantes: callos y otras sintomáticas.
- En caso de intoxicación no dar de beber tés ni bebidas alcohólicas.
- ANTIDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:

CEUTOS: Tel. 273-2318, 0800 71911
ESALUD: 411-8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido inutilice el envase tirándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por la autoridades locales para este fin. No disponer los envases con residuos municipales.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio ni quemarlos en los ríos.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos.

- No contaminar las fuentes de agua con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o los sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hasta cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todos las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Es un fungicida de contacto con acción preventiva para el control de una amplia gama de enfermedades que atacan a los cultivos.
NEMIZEB 800 WP, se prepara la dosis en un tercio de agua del recipiente, agitar bien hasta lograr una suspensión homogénea, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen requerido, continuar agitando y proceder con equipo de aspersión manual.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS			DOSIS		LITROS (ppm)
	NOMBRE	NOMBRE	kg/ha	kg/ha	kg/ha	
PAPA	Helo o "Helo"	Phytophthora infestans	0.8	1.2 - 1.8	7	5
	CEBOLLA	Peronospora allii	0.8	1.2	7	0.5

V.A. = Volumen de aplicación
L.A.R. = Límite Máximo de Aplicación
R.C. = Periodo de curación.

FRECUENCIA Y FORMA DE APLICACIÓN:

Puede aplicarse cuando las condiciones medio ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad o cuando se observen los primeros síntomas. Realizar 2 aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas por año, con un intervalo mínimo de 7 a 14 días entre aplicaciones dependiendo de la presión de la enfermedad.

PERIODO DE EINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común, no mezclar con aquellos de reacción dialina.

FITOTOXICIDAD:

Nemizeb 800 WP no es fitotóxico a los dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

