

NEMIZEB® 800 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Maconzeb..... 800.00 g/kg
Aditivos 200.00 g/kg

PQUA N° 348 - SENASA

Titular del Registro: SERFI S.A.

Formulador:



SINOCHEN NINGBO LTD.

N°599 Jiangnan Road,
Science and technology park,
Ningbo, Zhejiang, China.

Importado y Distribuido por:



Av. República de Panamá N° 2577,
La Victoria, Lima - Perú
Teléfono: 51(1) 710-4000

CONTENIDO NETO: 1 kg

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar el contenido en otros envases ni reutilizarlos.
- Realice la aplicación en la dirección del viento.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas sensibles.
- El producto no puede ser usado por personas que tengan problemas de tiroides o estén bajo tratamientos de afecciones tiroideas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Ditiocarbamate
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta o su copia.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión si el paciente está consciente, provocar el vómito, lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
 - En caso de intoxicación no dar de beber leche ni bebidas alcohólicas.
- ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:

CETOX: 0800 71911

ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido inutilice el envase triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por la autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o los sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Es un fungicida de contacto con acción preventiva para el control de una amplia gama de enfermedades que atacan a los cultivos.

NEMIZEB 800 WP se prepara la dosis en un tercio de agua del recipiente, agitar bien hasta lograr una suspensión homogénea, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen requerido, continuar agitando y proceder con equipo de aspersión terrestre.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/cil	Kg/ha		
Papa	Hielo o rancho	<i>Phytophthora infestans</i>	0.6	1.2 - 1.8	7	0.2
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.6	1.2	7	1.5

PC: Periodo de Carenzia LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede aplicarse cuando las condiciones medio ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad o cuando se observen los primeros síntomas. Realizar 2 aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas por año, con un intervalo mínimo de 7 a 14 días entre aplicaciones dependiendo de la presión de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común, no mezclar con aquellos de reacción alcalina. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

Nemizeb 800 WP no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

