

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado y en un lugar fresco y seco.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 48 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Evitar el contacto con los ojos (usar anteojos de protección), la piel y la ropa.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Fenoxidos.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, tratamiento médico puede ser requerido; y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar bien ventilado; respiración artificial puede ser requerida.
- No dar de beber nada ni induzca al vómito a un paciente que se encuentre inconsciente
- No se conoce antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

HUELLA

720 SL

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

2,4 D Sal amina 720 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 358 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 L

N° de Lote:
F. de Form.: "Ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:
SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
29 Xiaohang Road, Nanjing
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

HUELLA 720 SL es un herbicida selectivo, sistémico, de acción hormonal y de baja volatilidad. Es utilizado para el control de malezas en el cultivo de caña de azúcar.

En caso de caña de azúcar aplicar **HUELLA 720 SL** en post-emergencia, cuando las plantas superen los 20 cm de altura.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L / ha	P.C. (Días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Yuyo Verdolaga Amor seco Higuerilla Chamico Alfalfilla Anisillo	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Ricinus communis</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Melilotus indicus</i> <i>Fumaria capreolata</i>	3.0	No reportado	0.05
Maíz	Yuyo Verdolaga Chamico	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Datura stramonium</i>	1.5 - 2.0	7	0.05

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Por lo general, la etapa apropiada para la aplicación de **HUELLA 720 SL** es desde la germinación hasta los 25 días posteriores. Se recomienda no realizar más de 2 aplicaciones por campaña. Aplicar en suelos en capacidad de campo.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 48 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina, con productos oxidantes y ácidos fuertes.

FITOTOXICIDAD: HUELLA 720 SL no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

