



PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
Suspensión Concentrada (SC)

Composición:
Chlorfenapyr 240 g/l
Aditivos c.s.p 1 L

AQUA N° 354-SENASA

Titular del Registro: **SERFI S. A.**

Formulado por:
Agrodragon Co. Ltd.
16A Oriental International
Science and Technology Building,
N° 58, Xiangcheng Road,
Pudong New Area,
Shanghai 200122

Importador y Distribuidor por:
Serfi SA
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 710-4000

N° Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 1L

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- **PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Pirroles.
- Telefonos de Emergencia: Central de Urgencias y Emergencias:

CETOX: 0800 71911
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: suministre 2 vasos de agua e induzca al vómito introduciendo en la cavidad bucal un dedo. Nunca inducir al vómito a un paciente inconsciente.
- En caso de inhalación: traslade al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel: remueva la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: lavarse con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste consulte con un médico

ANTÍDOTO: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- No reutilizar los envases, ni enterrarlos.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No contamine lagos, ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Tillca es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, con buena actividad traslaminar y que se emplea en aspersión para el control de la “Polilla del tomate” *Tuta absoluta*.

Tillca se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS mL/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Científico			
Tomate	Polilla del Tomate	<i>Tuta absoluta</i>	250	7	0.05

P.C.= Período de carencia en días;

L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: No realizar mas de 2 aplicaciones por campaña/año. El intervalo de aplicación es de 14 días o más.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este periodo.

COMPATIBILIDAD: **Tillca** es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina y los agentes fuertemente oxidantes. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD: **Tillca** no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

