

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones y Advertencias de Uso y Aplicación:

No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
Durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas utilizar ropa protectora y equipos de protección indicados en la etiqueta.
Evitar el contacto con los ojos ya que causa irritación moderada.
Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel ya que puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
Evitar la inhalación del producto.
Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón.
Conserve **SUPERNURON 50 EC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.
No almacenar este producto en casas de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Benzotilúreas

En caso de ingestión: Dar a beber 1 a 2 tazas de agua e inducir el vómito para reducir al máximo la cantidad de producto ingerida. Realizar sólo si el afectado está consciente, siempre bajo supervisión médica. Trasladar lo antes posible a un centro asistencial, llevando el envase o etiqueta del producto.

En caso de inhalación: Mover al paciente al aire fresco. Mantenerlo en reposo.

Contacto con los ojos: Lavarlos inmediatamente con abundante agua limpia, manteniendo los párpados bien abiertos. Acudir al médico si existiera irritación.

En caso de contacto cutáneo: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavarse con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Síntomas de intoxicación: Náuseas y vómito pueden ocurrir después de la ingestión de estos pesticidas.

Tratamiento: El tratamiento es SINTOMÁTICO y DE APOYO

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Telf.: (511) 445-5346. CICOTOX: 328-7398. CETOX: 213-2318. ESSALUD en línea: 411-8000 opción 4.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los sobrantes del producto.
Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



SUPERNURON[®]

50 EC

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICION QUIMICA:

Lufenurón 50 g/L
Aditivos(c.s.p.) 1 Litro

N° DE REGISTRO: PQUA N° 375 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

Import. y Distrib.



**Av. Jose Pardo 620 Of. 409
Miraflores - Lima**

FORMULADO POR:

Oasis AgroScience Co., Ltd

Room 1510, No 500, Xinjian RD,
Shanghai, China

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: **1 Litro**

Fecha de Vencimiento:



NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

GENERALIDADES:

SUPERNURON 50 EC, es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, para el control de estadios larvales de Lepidópteros.

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y USO:

Modo de preparación:

Para preparar la mezcla (caldo) agregue la cantidad recomendada de **SUPERNURON 50 EC** al volumen de agua requerida y agite hasta obtener una solución homogénea. Los caldos de aspersión deben prepararse sólo inmediatamente antes de su aplicación y no deben guardarse para el día siguiente.

“CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	mL/200L de agua	L/ha		
Espárrago	“Copitarsia”	<i>Copitarsia decolora</i>	200	0.4	14	0.02

*P.C.: Periodo de carencia

**L.M.R.: Límite máximo de residuos (establecido por la Comunidad Europea).

Frecuencia y época de aplicación:

Realizar dos aplicaciones por campaña y al inicio de la aparición de la plaga (primeros estadios).

Periodo de reingreso:

El reingreso al área tratada es de 24 horas después de la aplicación.

Incompatibilidad:

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de reacción neutra. Sin embargo, las mezclas con productos alcalinos y compuestos a base de cobre no son compatibles. En caso de dudas, se debe hacer un ensayo previo.

Fitotoxicidad:

No es fitotóxico en el cultivo que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

