

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

1. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
2. El producto **SULCOPENTA**, debe conservarse en un envase original debidamente etiquetado y cerrado.
3. Prohibido almacenar y/o transportar el producto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
4. Durante el uso y aplicación del producto use ropa protectora y deberá reingresar al campo después de las 24 horas de aplicación.
5. Cámbiese y báñese después de usar **SULCOPENTA**, lave la ropa contaminada.
6. Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, alejado del calor.
7. Realice la aplicación de acuerdo a la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Intoxicación:** Inmediatamente llevar al paciente al medico y mostrar la etiqueta del producto.
- **Contacto con los Ojos:** Lavarse con abundante agua.
- **Contacto con la piel:** Lavarse con abundante agua por lo menos durante 5 minutos. Quitarse la ropa contaminada
- **Ingestión:** Si se ingiere accidentalmente, enjuagar la boca con bastante agua. Provocar el vomito si la persona esta consiente. Deberá acudir a un medico.
En caso de emergencia llamar a: CICOTOX 328-7398
Dirección: Av. Maquinarias 6015 - CALLAO, Lima.
TEL: 625-7501; Telefax: 625-7504
- **Antídoto:** No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito. (Disposición Complementarla Décima: D.S. N° 001-2015-MINAGRI):
- "Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado".
- "Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase".

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

1. Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración. Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución de la mezcla en la mezcla de aplicación y luego deséchelo triturándolo, perforándolo y deposítelo en un lugar destinado para este fin.
2. Peligroso para organismos acuáticos.
3. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vados.
4. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
5. Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
6. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre no permitir animales en el área tratada.
7. El aplicador deberá de tomar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
8. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

SULCOPENTA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Sulfato de cobre pentahidratado: 25% p/v.

Aditivos: c.sp. 100% p/v.

Reg.: PQUA N° 380 - SENASA

Titular de Registro: FERROSALT S.A.

Formulado y distribuido por:

Ferrosalt s.a.
DIVISIÓN AGRO

Oficina:
Dirección: Ca. Enrique Palacios # 335 / 4to piso / Miraflores - Lima
Teléfonos: 625-7500 / 625-7524
Planta:
Dirección: Prolong Av. Industrial lote 4 Urb. Las Praderas de Lurín - Lurín - Lima
Teléfonos: 637-0300 / 637-0310

CONTENIDO NETO: 1 L

LOTE N°:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SULCOPENTA es un fungicida de acción preventiva y sistémica. Actúa contra diversas especies de hongos fitopatógenos como *Lasiodiplodia theobromae*, *Botrytis sp.*, *Phytophthora capsici*.

- Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Cuadro de usos:

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS	P.C. (días)	LMR
	Nombre Común	Nombre Técnico	Por cilindro 200 lts.		
PALTO	MARCHITEZ REGRESIVA	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	400 a 500 ml.	N.A.	N.A.
VID	PODREDUMBRE GRIS	<i>Botrytis cinerea</i>	500 ml.	N.A.	N.A.
ALCACHOFA	MARCHITEZ RADICULAR	<i>Phytophthora capsici</i>	400 a 500 ml.	N.A.	N.A.
MANGO	MARCHITES REGRESIVA	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	500 ml.	N.A.	N.A.

PC: Período de Carenia. N.A.: No aplica.

LMR: Límite Máximo de Residuos. N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Realizar un máximo de una aplicación por campaña al año (frutales)
- Las aplicaciones en frutales serán realizadas antes de la floración o después del cuajado.
- En cultivos anuales aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para la incidencia de la enfermedad, pero antes que se observen los síntomas. Repetir cada 7 a 10 días, según las condiciones climáticas. Rotar con otros productos como los sistémicos. Usar buen volumen de agua a fin de cubrir bien toda la planta.
- Se puede aplicar es aspersión al follaje, en drench al cuello de la planta o en pintura al tronco de los arboles.
- Usar agua limpia con pH neutro.

PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SULCOPENTA es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina

FITOTOXICIDAD

SULCOPENTA no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendadas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

