

TAMAÑO DE PROYECTO DE ETIQUETA: 28 cm. x 13.7 cm.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- El producto debe conservarse en el envase original debidamente etiquetado y cerrado.
- Prohibido almacenar y/o transportar el producto con alimentos, medicinas, bebidas y forrajes.
- Durante el uso y aplicación del producto use ropa protectora y deberá reingresar al campo después de 24 horas.
- Cámbiese y báñese después de usar el producto, y lave la ropa contaminada.
- Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, alejado del calor.
- Realizar la aplicación de acuerdo a la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Cúpricos
- Intoxicación: inmediatamente llevar al paciente al médico y mostrar la etiqueta del producto.
- Contacto con los ojos: Lavarse con abundante agua.
- Contacto con la piel: Lavarse con abundante agua por lo menos 5 minutos, quitarse la ropa contaminada.
- Ingestión: Si se ingiere accidentalmente enjuagar la boca con abundante agua. Provocar el vómito si la persona esta consciente. Deberá acudir al médico.
- TELEFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX (01) 3287700 / 956740869.
Teléfono del titular 01 625 7500, 01 625 7524.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Para envases rígidos:
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
 - Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia los cuerpos de agua de por lo menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en la área tratada.
- El aplicador deberá tomar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

SULCOPENTA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Sulfato de cobre pentahidratado 25% p/v
Aditivos: c.sp. 100% p/v

Registro: PQUA N° 380 - SENASA
Titular de Registro: FERROSALT S.A.

Formulado y distribuido por
Ferrosalt s.a.
DIVISIÓN AGRO

Oficina:
Dirección: Ca. Enrique Palacios No. 335 4to. piso / Miraflores - Lima
Teléfonos: 625-7500 / 625-7504
Planta:
Dirección: Prolong. Av. Industrial Lote 4, Urb. Las Praderas de Lurín - Lurín - Lima
Teléfonos: 637-0300 / 637-0310

FECHA DE FORMULACIÓN:
LOTE N°:
CONTENIDO NETO: 1 LITRO
FECHA DE VENCIMIENTO:

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SULCOPENTA es un fungicida de acción preventiva y curativa (es sistémica). Actúa sobre diversas especies de hongos fitopatógenos como *Lasiodiplodia theobromae*, *Botrytis sp.*, *Phytophthora capsici*.

- Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua agitar bien y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS	P.C.	LMR
	Nombre Común	Nombre Técnico	Por cilindro 200 lts		
PALTO	MARCHITEZ REGRESIVA	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	400 a 500 ml	N.A.	N.A.
VID	PODREDUMBRE GRIS	<i>Botrytis cinerea</i>	500 ml	N.A.	N.A.
ALCACHOFA	MARCHITEZ RADICULAR	<i>Phytophthora capsici</i>	400 a 500 ml	N.A.	N.A.
MANGO	MARCHITEZ REGRESIVA	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	500 ml	N.A.	N.A.
ARANDANO	MARCHITEZ REGRESIVA	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	600 a 800 ml	N.A.	N.A.
ARANDANO	ROYA DE LA HOJA	<i>Naohidemycs vaccinii</i>	600 a 800 ml	N.A.	N.A.

PC: Periodo de Carenia. N.A.: No aplica. LMR: Límite Máximo de Residuos.
Gasto de agua: 280 - 290 L/Ha en arandanos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Realizar un máximo de una aplicación por campaña al año (frutales)
- Las aplicaciones en frutales serán realizadas antes de la floración o después del cuajado.
- En cultivos anuales aplicar cuando las condiciones son apropiadas para la incidencia de la enfermedad, pero antes que se observen los síntomas. Repetir cada 7 a 10 días según las condiciones climáticas. Rotar con productos sistémicos. Usar buen volumen de agua a fin de cubrir toda la planta.
- Se puede aplicar en aspersión al follaje, en drench al cuello de la planta o en pintura al tronco de los árboles.
- Usar agua limpia con un pH neutro.

PERIODO DE REINGRESO

- No entrar a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SULCOPENTA es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con productos de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

