

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrole copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta".

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

**ESSALUD** en línea (línea gratuita): 0801-10200 - 411- 8000, opción 4 **CAISAC** (01) 253-6444

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

| CULTIVO   | PLAGA                         |                               | DOSIS  |         | P.C.<br>(Días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|--------|---------|----------------|--------------|
|           | NOMBRE COMÚN                  | NOMBRE CIENTÍFICO             | g/200L | g/ha    |                |              |
| Alcachofa | Oidium                        | <i>Leveillula taurica</i>     | -      | 150-200 | 7              | 5            |
| Arándano  | Moho Gris                     | <i>Botrytis Cinerea</i>       | -      | 60      | n.d.           | 0,5          |
| Café      | Ojo de pollo<br>/ojo de gallo | <i>Mycena Citricolor</i>      | 80     | -       | 30             | 0,1          |
| Cebolla   | Mildiu                        | <i>Peronospora destructor</i> | 125    | 250     | -              | 10           |
| Espárrago | Cercospora                    | <i>Cercospora asparagi</i>    | 50-75  | 100-150 | 3              | 0,01         |
| Mandarina | Botrytis                      | <i>Botrytis cinerea</i>       | -      | 240     | 0              | 15           |
| Palto     | Oidium                        | <i>Botrytis Cinerea</i>       | -      | 200     | -              | 0,05         |
| Pimiento  | Oidium                        | <i>Leveillula taurica</i>     | 60     | -       | 3              | 3            |
| Vid       | Oidiosis                      | <i>Erysiphe necator</i>       | 100    | -       | 14             | 2            |

\*El gasto de agua fue de 600 L/ha

\*\*El gasto de agua fue de 1000 L/ha

P.C.: Período de Carenacia

LMR: Límite Máximo de Residuos

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

® Marca registrada



# TOKE<sup>®</sup>

## 50 WG

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRICOLA**

**GRANULOS DISPERSABLES - WG**

**Composición Química:**

Azoxystrobin.....500 g/kg

Aditivos ..... c.s.p.1 kg

**Reg. PQUA N° 403 - SENASA**

Titular de Registro:

**Comercial Andina Industrial S.A.C.**

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
 Telf.: (01) 253-6444 e-mail: atencioncliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

**OASIS AGROSCIENCE LIMITED**

Oficina 1:12/F Lucky Building 39 Wellington Street Central Hong Kong, China  
 Planta: Room 1510, N° 500, Xinjiang Road, Shanghai, China  
 Telf.: 0086-21-63807578

Importado y Distribuido por:

**GRUPO ANDEX S.A.C.**

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 703. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
 Telf.: (01) 253-6444 e-mail: atencioncliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

**Contenido Neto: 50 g**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**