

PELTON 75 PM

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Cyromazine..... 750 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 396 - SENASA



Titular del Registro:
CROP PROTECTION S.A.C.
Calle Pedro Coronado 290.
Los Olivos. Lima-Perú

Fabricado y formulado por:
YIXING XINGNONG CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD
Wanshi Town Yixing City,
Jiangsu Province
China 214217
Telf. (86-510)87851001

Importado y Distribuido por:
CROP PROTECTION S.A.C

Contenido Neto: 70 g.

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Realice la operación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en lugar sombreado seco y ventilado en sus envases originales bien cerrados, lejos de la luz directa.
- Usar máscara, guantes y gafas protectoras durante el manejo del producto.
- Muy tóxico por inhalación.
- Tóxico por ingestión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Irritante para las vías respiratorias.
- En caso de incendio se generan gases tóxicos y/o irritantes; usar respirador o máscara de protección.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa, así como la inhalación del polvo.
- Evitar almacenar a temperaturas superiores a 35°C.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Triazinas

- En caso de presentar los síntomas de intoxicación quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua limpia. Llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - Salpicaduras en la piel y ojos lavarlos rápidamente con abundante agua limpia.
 - Nota al médico si el producto ha sido ingerido.
 - No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- TELÉFONO DE EMERGENCIA: CICOTOX : 0800-1-304

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo, perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas; no aplicar en época de floración.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Evitar el uso del producto en suelos arenosos o en zonas de napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

• **PELTON 75 PM** es un insecticida sistémico regulador del crecimiento que actúa por contacto, interfiriendo el desarrollo normal de los estados inmaduros de *Liriomyza huidobrensis*, afectando la muda y empupamiento.

• **PELTON 75 PM** aplicado sobre la planta tiene actividad translaminar y sistémica, controlando larvas de mosca minadora en los cultivos de papa y alcachofa.

• Se recomienda aplicar **PELTON 75 PM** ante la presencia de las primeras minas en las hojas del tercio inferior o a la presencia de adultos.

• **PELTON 75 PM** se emplea diluido en agua, preparar una pre-mezcla distribuyendo la cantidad necesaria del **PELTON 75 PM** en balde. Luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua de aplicación.

• **PELTON 75 PM** puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochila a palanca, a motor. Se deben iniciar las aplicaciones luego de un monitoreo del cultivo, aplicando de manera uniforme.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

• Puede variar de acuerdo a la incidencia (monitoreo) del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.

• Número máximo de aplicaciones por campaña: 3

PERIODO DE REINGRESO

• Puede reingresar a las 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

• **PELTON 75 PM** es compatible con la mayoría de plaguicidas de reacción neutra.

FITOTOXICIDAD

• **PELTON 75 PM** no es fitotóxico cuando se utiliza como es indicado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las características físico químicas indicadas en la etiqueta y es apto para los fines que se recomienda, siguiendo las instrucciones dadas en el cuadro de usos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADROS DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS gr/ 200L.	Periodo de carencia (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
PAPA	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70	21	0.5
ALCACHOFA			70	7	0.5

L.M.R. Límite Máximo de Residuos

