## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

## MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
- Usar lentes protectores y respirador cuando se manipule el producto.
- No utilice este envase para conservar alimentos o aqua.

### **PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- : 0800-1304 Teléfonos de Emergencia: CICOTOX **ESSALUD** 423-7600 PINERALANDINA S.A.: 01 348-1018
- Antídotos: no hay antídoto específico.

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No disponer los envases con residuos municipales.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN **DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. Utilizar una banda de protección hacia cuerpos de agua de al menos
- 5 metros.
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.



10 CE

# **INSECTICIDA AGRÍCOLA**

## **CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

### COMPOSICION QUIMICA: Alfacipermetrina....

900 g/l TOTAL 1000 g/l

100 g/l

## Reg. PQUA 392 SENASA

### CONTENIDO NETO:

Aditivos hasta completar un litro.

Lote No.:

Fecha de Formulación:


Fecha de Vencimiento:



#### TITULAR DEL REGISTRO Pineral Andina S.A.

Av. Flora Tristán 463 Of. 201. Urb. Santa Patricia II Etapa. La Molina. Lima-Perú.

Telf.: 348-1018 Telefax: 349-9609 FABRICADO Y FORMULADO POR:



Centre Nanxing Street, Shangcheng Point District Hangzhou 31000, China Telf. +86(0)571-86959101

> IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: Pineral Andina S.A.

**NO EXPLOSIVO** 

INFLAMABLE

NO CORROSIVO



### INDICATIVOS DE USO Y MANEJO

GALAXY 10CE es un insecticida Piretroide que actúa por contacto e ingestión, empleado en el control de las plagas recomendadas en esta etiqueta. Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme.

Se recomienda que diluido el producto no puede se almacenado por más de

## CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO **USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:**

Cultivos	Plaga		Dósis	Periodo de Carencia	L.M.R.
	Nombre comun	Nombre tecnico	ml/200 L	(días)	(ppm)
Alfalfa	Gusano ejercito	Prodenia spp.	125	14	0,5
Algodón	Gusano rosado	Pectinophora gossypiella	125	14	0,1
	Arrebiatado	<u>Dysdercus</u> peruvianus	125	14	0,1
Col	Gusano de hoja	Plutella spp	125	14	1
Frijol	Gusano medidor	<u>Pseudoplusia</u> spp	150	14	0,05
Maíz	Cogollero	Spodoptera frugiperda	125	14	0,05
Рара	Mosca minadora (adultos )	<u>Liriomyza</u> huidobrensis	100	14	0,05
Sandía	Perforardor de guias	<u>Diaphania</u> <u>spp</u>	125	14	0,05
Tomate	Polilla	Scrobipalpula absoluta	150	14	0,1

LMR= Límite máximo de Residualidad, en partes por millón (ppm)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN. - Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas v/o larvas.

Número máximo de aplicaciones: 4 campaña /año PERIODO DE REINGRESO.- Como mínimo 4 horas.

COMPATIBILIDAD.- No compatible con materiales de alta acidez o

alcalinidad. FITOTOXICIDAD.- No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la

etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL- El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e nstrucciones dadas.













MODERADAMENTE PELIGROSO **DAÑINO** 

















