

27.5 cm

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
- Usar lentes protectores y respirador cuando se manipule el producto.
- No utilice este envase para conservar alimentos o agua.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Antídotos: no hay antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Utilizar una banda de protección hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

GALAXY®

**10 CE
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Alpha-cypermethrin 100 g/L
Aditivos C.S.D. 1L

Reg. PQUA N° 392 - SENASA

Titular de Registro: INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.
Santiago de Surco, Lima – Perú
Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por: YIXING XINGHONG CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD

Wanshi Town Yixing City, Jiangsu Province China
214217.

Teléfono: (86-510) 87851001

Importado y distribuido por: PERU PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.

Av. Nicolás Arriola 2374- San Luis. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 5470638

Contenido Neto: 1L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO



INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GALAXY 10 CE es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión, empleado en el control de las plagas recomendadas en esta etiqueta. Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. La aplicación es mediante aspersión, se recomienda aplicar un equipo manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme. Se recomienda que diluido el producto no puede ser almacenado por más de 12 horas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS L/200L	DOSIS L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
Añafra	Gusano elereto	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.125	0.25	14	0.5
Algodón	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	0.125	0.25	14	0.1
	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	0.125	0.25	14	0.1
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2 - 0.25	0.4 - 0.5	7	0.01
Cot	Gusano de la hoja	<i>Plutella spp.</i>	0.125	0.25	14	1
Frijol	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia spp.</i>	0.150	0.3	14	0.05
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.125	0.25	14	0.05
Papa	Mosca minadora (adultos)	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.100	0.20	14	0.05
Sandia	Perforador de guías	<i>Diaphania spp.</i>	0.125	0.25	14	0.05
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	0.150	0.30	14	0.1
Vid	Thrips	<i>Frankliniella williamsi</i>	0.1	0.5	21	0.2

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña /año.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas despues de la aplicacion del producto.

COMPATIBILIDAD: No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



14.5 cm