"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un ambiente seco ventilado.
Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento
Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas medicinas ni forrajes.
Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico : Triazina.
En caso de intoxicación oral, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarale la etiqueta.
En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. Acudir al médico si hay intoxicación dermal.
No se ha determinado antídoto específico.
Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.
TELÉFONO DE EMERGENCIA: CICOTOX 0-800-1-3040
POINT ANDINA S.A. (01)348-1018
ESSALUD en Línea 411-8000 Opción 4.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo y triturarlo y/o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Tóxico para organismos acuáticos.
Peligroso para aves.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacios.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicar hacia cuerpos de agua al menos 5 metros.
Peligroso para animales domesticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el area tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
En el cado de derrame, no recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

SUPREMO 480 SC

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA -SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Metribuzin.....480 g/L
Aditivos .....c.s.p. 1L

Reg. PQUA Nº 367- SENASA

Titular de Registro:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto MzA6 Lote15
La Molina. Lima 12- Perú
Tel: (01)348 -1018.

Formulado por:
Point Agro-China Limited
Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu, 214217, China
Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

Importado y Distribuido por:
FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos-Lima, PERÚ
Telefono: 614-1500 Fax: 614-1517

FARMAGRO S A
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Contenido Neto: 1L
Lote Nº :
Fecha de Producción:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SUPREMO 480 SC es un herbicida sistemático, pre y post emergente al cultivo perteneciente al grupo de triazinas, selectivo para cultivos de hojas angostas y anchas. **SUPREMO 480** es absorbido por las hojas y raíces, su efecto aparece sobre el follaje rápidamente y obstaculiza la fotosíntesis. Se acumula en los meristemos (puntos de crecimiento). **SUPREMO 480 SC** se emplea diluido en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea. **SUPREMO 480SC** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadores, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc,) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado . Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo de la presencia de malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS :

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS		P. C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	mL/cil 200 L	L/ha		
TOMATE	"Cadillo"	*Cenchurs sp.*	200	0.2	50	0.1
	"Leptocloa"	*Leptochloa uninervia*	200	0.2	50	0.1
	"Pata de gallina"	*Eleusine indica*	200	0.2	50	0.1
	"Verdolaga"	*Portulaca oleracea*	200	0.2	50	0.1
	"Yuyo"	*Amaranthus sp.*	200	0.2	50	0.1
	"Hierba de gallinazo"	*Chenopodium murale*	200	0.2	50	0.1
PAPA	"Capuli cimarrón"	*Nicandra physalodes*	300-400	0.3-0.4	42	0.05
	"Chamico"	*Datura stramonium*	300-400	0.3-0.4	42	0.05
	"Hierba del gallinazo"	*Chenopodium murale*	300-400	0.3-0.4	42	0.05
	"Lechera"	*Euphorbia hirta*	300-400	0.3-0.4	42	0.05
	"Lengua de vaca"	*Rumex crispus*	300-400	0.3-0.4	42	0.05
	"Moco de pavo"	*Echinocloa crus-galli*	300-400	0.3-0.4	42	0.05
	"Pata de gallina"	*Eleusine indica*	300-400	0.3-0.4	42	0.05
	"Rabo de zorro"	*Setaria parviflora*	300-400	0.3-0.4	42	0.05
	"Yuyo hembra"	*Amarantus hybridus*	300-400	0.3-0.4	42	0.05
Esparrago	"Verdolaga"	*Portulaca oleracea*	120-180	0.2-0.3	14	0.05
	"Yuyo"	*Amaranthus hybridus*	120-180	0.2-0.3	14	0.05
Zanahoria	"Amor seco"	*Bidens pilosa*	-	0.4	60	0.1
	"Lechera"	*Euphorbia hirta*		0.4	60	0.1
	"Verdolaga"	*Portulaca oleracea*		0.4	60	0.1
	"Chamico"	*Datura stramonium*		0.4	60	0.1
	"Pata de gallina"	*Eleusine indica*		0.4	60	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

•Realizar 1 aplicación /campaña teniendo en cuenta 2 campañas/año
•Se recomienda hacer la aplicación pre emergente al cultivo y a la maleza o de lo contrario aplicar antes de realizar el transplante. Las aplicaciones post emergentes, deben ser temprano al cultivo y a la maleza (plantas no mayores de 10cm de altura y antes del macollamiento).

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda aplicar **SUPREMO 480SC** solo,sin mezcla con ningún otro pesticida.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda en la etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PANTONE 362 C PANTONE 541 C PANTONE 362 C PANTONE Yellow C PANTONE Process Black C PANTONE 485 C PANTONE 555 C PANTONE 639 C