

17.6 cm

LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco y bien ventilado.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazina.
- En caso de intoxicación oral, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica.

En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. Acudir al médico si hay intoxicación dermal

No se ha determinado antídoto específico.

Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos:

CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para aves.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

SUPREMO

480 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN

Metribuzin 480 g/L
Aditivos c.s.p.1 L

Reg. N° 367 - SENASA

Títular de Registro, Importado y Distribuido por:

POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto 304,
Sta Patricia II Etapa, La Molina, Lima
Perú Tel: (01)348 -1018.

Formulado por:

POINT AGRO-CHINA LIMITED
Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu, 214217 China
Tel. (86 - 510) 8785 1001



Point
ENTREGAMOS CALIDAD



INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

13.4 cm

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

-SUPREMO 480 SC es un herbicida sistémico, pre y post emergente al cultivo perteneciente al grupo de triazinas, selectivo para cultivos de hojas angostas y anchas.

-SUPREMO 480 SC es absorbido por las hojas y raíces, su efecto aparece sobre el follaje rápidamente y obstaculiza la fotosíntesis. Se acumula en los meristemos (puntos de crecimiento).

-SUPREMO 480 SC se emplea diluido en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

-SUPREMO 480 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo de la presencia de malezas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS		P. C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/cil 200 L	L/ha		
Espárrago	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	120-180	0.2-0.3	14	0.05
	"Yuyo"	<i>Amaranthus hybridus</i>	120-180	0.2-0.3	14	0.05
Papa	"Capuli cimarrón"	<i>Nicandra physalodes</i>	300-400	0.3-0.4	42	0.05
	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>	300-400	0.3-0.4	42	0.05
	"Hierba del gallinazo"	<i>Chenopodium murale</i>	300-400	0.3-0.4	42	0.05
	"Lechera"	<i>Euphorbia hirta</i>	300-400	0.3-0.4	42	0.05
	"Lengua de vaca"	<i>Rumex crispus</i>	300-400	0.3-0.4	42	0.05
	"Moco de pavo"	<i>Echinochloa crus-galli</i>	300-400	0.3-0.4	42	0.05
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>	300-400	0.3-0.4	42	0.05
	"Rabo de zorro"	<i>Setaria parviflora</i>	300-400	0.3-0.4	42	0.05
"Yuyo hembra"	<i>Amaranthus hybridus</i>	300-400	0.3-0.4	42	0.05	
Tomate	"Cadillo"	<i>Cenchrus sp.</i>	200	0.2	50	0.1
	"Leptochloa"	<i>Leptochloa uninervia</i>	200	0.2	50	0.1
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>	200	0.2	50	0.1
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	200	0.2	50	0.1
	"Yuyo"	<i>Amaranthus sp.</i>	200	0.2	50	0.1
"Hierba de gallinazo"	<i>Chenopodium murale</i>	200	0.2	50	0.1	
Zanahoria	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>	-	0.4	60	0.1
	"Lechera"	<i>Euphorbia hirta</i>	-	0.4	60	0.1
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	-	0.4	60	0.1
	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>	-	0.4	60	0.1
"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>	-	0.4	60	0.1	

PC: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda hacer la aplicación pre emergencia al cultivo y a la maleza o de lo contrario aplicar antes de realizar el transplante. Las aplicaciones post emergentes, deben ser temprano al cultivo y a la maleza (plantas no mayores de 10 cm de altura y antes del amacollamiento).

NUMERO MÁXIMO DE APLICACIONES POR CAMPAÑA:

Realizar 1 aplicación/campaña, teniendo en cuenta 2 campañas/año.

PERIODO DE REINGRESO:

Se puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda aplicar SUPREMO 480 SC solo, sin mezcla con ningún otro pesticida.

FITOTOXICIDAD:

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda en la etiqueta.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES

No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Títular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

