

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- El producto causa irritación moderada a los ojos, es ligero irritante dérmal.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar a la zona tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fenoxiacéticos
- Teléfonos de Emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de Essalud 117 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita), CropCare (01) 630-6420.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante un minuto de 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lave con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, aplicar lavado gástrico, usando una solución al 5% de bicarbonato de sodio. Tratamiento futuro sintomático.
- Nota al médico: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligro con los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe utilizarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Considerar que en caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar su retención de 2,4-D, a fin de reducir su movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Borrator®

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

2,4-D 720 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. POUA Nº: 389-SENASA

Titular del Registro:

FARMEX S.A.
Calle Dean Vaidíva Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6420 Fax: (01) 630-6410

Fabricado y Formulado por:

Zhejiang Chemicals
Import & Export Co.

Nº 37 Qingchun Rd,
Hangzhou (310009), China
Tel: +86 571 2896 8630
Fax: +86 571 8704 6332

Importado por: FARMEX S.A.

Distribuido por:



CONTENIDO NETO:

Lote Nº: _____
F. Fab. : _____
F. Venc.: _____
NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



UNIGRAF SAC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
BORRATOR® es un herbicida postemergente, selectivo y sistémico, recomendado para el control de malezas anuales y perennes de hoja ancha. Es absorbido rápidamente por las raíces y el foliole.

- **Malezas que controla:**
- **Malezas anuales:** *Bidens pilosa* (amor seco), *Euphorbia heterophylla* (lechera), *Sonchus oleraceus* (cetraria), *Portulaca oleracea* (verdolaga), *Physalis peruviana* (capulí), *Melilotus indica* (alfalfa), *Solanum nigrum* (hierba mora), *Chenopodium murale* (hierba del gallinazo).
- **Malezas perennes:** *Fumex crispus* (lengua de vaca).

Sistema de Preparación y Aplicación

BORRATOR® se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"
CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
Caña de Azúcar	1.5	42	0.05

PC: Periodo de carencia. **LMR:** Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar en postemergencia de malezas. No realizar más de una aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con otros herbicidas postemergentes, pero no con productos alcalinos. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

BORRATOR® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.