LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Este producto es ligeramente tóxico, no ingerir.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazinas

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, induzca al vómito, siempre y cuando la persona se encuentre consciente.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia y si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco. Si respira con dificultad suministrar oxígeno y ventilación asistida.

Nota al médico: No hay antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia
CICOTOX: 0800-1-3040
Aló EsSalud: 472-2300 (emergencias 24 horas)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, incluyendo algas, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos ó envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivo de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe emplearse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Atridas® 500 sc

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Atrazina.....500 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 373-SENASA

Importado y Distribuido por:

QSI

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.

Contenido Neto: 1 L

Formulado por:
SHARDA CROPCHEM LIMITED.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (W),
Mumbai - 400050. India.

Titular del Registro:
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.
Av. República de Panamá 2577.
La Victoria. Lima-Perú
Telf.: 710-4000

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ATRIDAS 500 SC es un herbicida sistémico selectivo usado para el control de malezas de hoja ancha y algunas gramíneas en etapa de pre-emergencia.

ATRIDAS 500 SC se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla, distribuyendo la cantidad necesaria del producto en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila, según sea el caso, y se completa hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación. El producto puede ser aplicado utilizando equipos convencionales como mochila a palanca o a motor.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/ha)	(L/cil)	(días)	(ppm)
Caña de azúcar	Yuyo	*Amaranthus dubius*	2	---	30	0.05
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*				
	Lechera	*Euphorbia peplus*				
	Amor seco	*Bidens pilosa*				
	Chamico	*Datura stramonium*				
	Hierba del gallinazo	*Chenopodium murale*				
	Capuli	*Nicandra physalodes*				
	Grama china	*Sorghum halepense*				
	Rabo de zorro	*Setaria verticillata*				
	Cadillo	*Cenchrus echinatus*				
	Pata de gallina	*Eleusine indica*				
	Pichana	*Sida acuta*				
	Mata gusano	*Flaveria bidentis*				
Maíz	Amor seco	*Bidens pilosa*	---	0.4 - 0.5	45	0.1
	Cadillo	*Cenchrus echinatus*				
	Capuli cimarrón	*Nicandra physalodes*				
	Chamico	*Datura stramonium*				
	Hierba del gallinazo	*Chenopodium ambrosioides*				
	Lechera	*Euphorbia peplus*				
	Pata de gallina	*Eleusine indica*				
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*				
	Yuyo	*Amaranthus hybridus*				

PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una sola aplicación por campaña en etapa pre-emergente de la maleza en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar a las áreas tratadas 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No es compatible con medios fuertemente ácidos o alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad si se usa en los cultivos y a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO