**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Este producto es ligeramente tóxico, no ingerir.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Triazinas**

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, induzca al vómito, siempre y cuando la persona se encuentre consciente.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia y si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco. Si respira con dificultad suministrar oxígeno y ventilación asistida.

**Nota al Médico:** No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**Teléfonos de emergencia**
**EsSalud: 411-8000 (opción 4)**

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, incluyendo algas, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos ó envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivo de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe emplearse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# Atridas® 500 sc

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## HERBICIDA AGRÍCOLA

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**Composición:**

Atrazina.....500 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N° 373-SENASA**

**Titular del Registro:**

Serfi

**Formulado por:**
**LAQUINSA ANDINA S.A.**
Km 5.5 vía Durán - Tambo,
Guayaquil, Ecuador.

**Importado y Distribuido por:**
**SERFI S.A.**
Av. República de Panamá 2577.
La Victoria. Lima-Perú
Telf.: 710-4000

**Contenido Neto: 1 L**
**Lote N°:**
**Fecha de Form.:**
**Fecha de Venc.:**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**ATRIDAS® 500 SC** es un herbicida sistémico selectivo usado para el control de malezas de hoja ancha y algunas gramíneas en etapa de pre-emergencia.

**ATRIDAS® 500 SC** se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla, distribuyendo la cantidad necesaria del producto en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila, según sea el caso, y se completa hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación. El producto puede ser aplicado utilizando equipos convencionales como mochila a palanca o a motor.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | (L/ha) | (L/cil) | | |
| Caña de azúcar | Yuyo | *Amaranthus dubius* | 2 | --- | 30 | 0.05 |
| | Verdolaga | *Portulaca oleracea* | | | | |
| | Lechera | *Euphorbia peplus* | | | | |
| | Amor seco | *Bidens pilosa* | | | | |
| | Chamico | *Datura stramonium* | | | | |
| | Hierba del gallinazo | *Chenopodium murale* | | | | |
| | Capulí | *Nicandra physalodes* | | | | |
| | Grama china | *Sorghum halepense* | | | | |
| | Rabo de zorro | *Setaria verticillata* | | | | |
| | Cadillo | *Cenchrus echinatus* | | | | |
| | Pata de gallina | *Eleusine indica* | | | | |
| | Pichana | *Sida acuta* | | | | |
| | Mata gusano | *Flaveria bidentis* | | | | |
| Maíz | Amor seco | *Bidens pilosa* | --- | 0.4 - 0.5 | 45 | 0.1 |
| | Cadillo | *Cenchrus echinatus* | | | | |
| | Capuli cimarrón | *Nicandra physalodes* | | | | |
| | Chamico | *Datura stramonium* | | | | |
| | Hierba del gallinazo | *Chenopodium ambrosioides* | | | | |
| | Lechera | *Euphorbia peplus* | | | | |
| | Pata de gallina | *Eleusine indica* | | | | |
| | Verdolaga | *Portulaca oleracea* | | | | |
| | Yuyo | *Amaranthus hybridus* | | | | |

PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una sola aplicación por campaña en etapa pre-emergente de la maleza en el cultivo.

## PERIODO DE REINGRESO

Ingresar a las áreas tratadas 48 horas después de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD

No es compatible con medios fuertemente ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

## FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad si se usa en los cultivos y a las dosis recomendadas.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**