19 cm

23 cm

BELGRAN®

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

COMPOSICIÓN:
Bensulfuron methyl ..... 600 g/Kg
Aditivos ..... csp 1 Kg

PQUA Nº 387 - SENASA

INTEROC CUSTER

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formuldor:
NINGBO GENERIC
CHEMICAL Co., LTD
Room 10-6, Shidai Square, No. 8,
Lengjing Street, Ningbo 315010
Telf.: +86 574 87301088
Zhejiang - China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **1Kg**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

3.4 cm

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

19 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir. No comer, beber ni fumar durante las preparaciones de mezcla y aplicaciones. Durante la manipulación y aplicación, hacer uso de botas, mascarilla, careta de protección y ropa protectora. Para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas, después de la aplicación, hacer uso del equipo de protección. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Después de usar el producto, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón. Ningún envase de plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Almacenar el producto bajo llave en un lugar con techo, fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo Químico: Sulfonylurea.
En caso de intoxicación solicitar atención médica inmediatamente ó lleve al paciente al centro toxicológico mostrando el envase, etiqueta u hoja de seguridad. Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
En caso de ingestión inducir al vómito, sólo si el paciente está consciente y dar de beber abundante agua.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con los párpados abiertos con abundante agua.
En caso de contaminación dermal, retirar la ropa, lave la piel afectada con abundante agua, si hubiera irritación buscar atención médica.
En caso de inhalación llevar al paciente al aire fresco y buscar ayuda médica.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CITOTOX: 0800-1-3040(Línea gratuita)
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo, perforándolo, y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. No emplear el envase para ningún otro fin. Los envases una vez usados se deben almacenar en sitios especiales; para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en ríos o fuentes de agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
BELGRAN® es un herbicida sistémico, selectivo, absorbido por el follaje y raíces, para el control de "Coquito" o "Cabeza de mono" *Cyperus difformis.* Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende proteger. Colocar en un cilindro de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de **BELGRAN®** de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Finalmente adicionar el resto de agua y volver a agitar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Realizar una sola aplicación de **BELGRAN®** cuando se observe la presencia de la maleza en el campo, ya que se trata de un herbicida post emergente. Se indica una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
Se recomienda hacer pruebas de campo.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico.

RESPOSABILIDAD CIVIL:
"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este empaque corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (g/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz *(Oryza sativa)*	"Cabeza de mono" ó "Coquito"	*Cyperus difformis*	100	60	0.02

PC: Periodo de Carencia **LMR:** Límite Máximo de Residuos