

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.

Durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas, utilizar ropa protectora y equipo de protección personal indicado en la etiqueta. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.

Evitar el contacto con los ojos ya que causa irritación moderada.

Evitar la inhalación y contacto con la piel.

Después de la aplicación bañese con abundante agua fría y jabón.

No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.

No almacene este producto en casas de habitación.

Conserve **Supercur 250 EW**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazoles

En caso de ingestión: Si la ingesta fue accidental y la persona está conciente dar a beber dos vasos de agua. Nunca suministrar nada por boca, ni inducir el vómito a una persona inconciente. Asistencia médica inmediata.

En caso de inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre y si la respiración es dificultosa llamar al médico.

En caso de contacto con la piel: Quitar rápidamente la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

En caso de contacto ocular: Inmediatamente lavar con grandes cantidades de agua durante 15 minutos como mínimo, Manteniendo los párpados abiertos. Consultar al médico (oftalmólogo).

Síntomas de intoxicación: dolor abdominal, náuseas, gastritis, dificultad respiratoria, diarrea.

Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Telf.: (511) 445-5346. CICOTOX: 328-7398 . CETOX: 213-2318. ESSALUD en línea: 4118000 opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos ó envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Supercur® 250 EW

FUNGICIDA AGRICOLA

EMULSION ACEITE EN AGUA (EW)

COMPOSICION QUIMICA:

Tebuconazole..... 250 g / L

Aditivosc.s.p. 1 Litro

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 385 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

Import. y Distrib.



Av. Jose Pardo 620 Of. 409
Miraflores - Lima

FORMULADO POR:

Oasis AgroScience Co., Ltd

Room 1510, NO 500, Xinjian RD,
Shanghai, China

Fecha de Formulación:

Nº de Lote:

Contenido Neto: **1 Litro**

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo de preparación:

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **Supercur 250 EW**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	cc/200L de agua	cc/ha		
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	250	500	30	0.05

*PC: Periodo de Carencia

** LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación .

COMPATIBILIDAD

En general se aplica solo. Se recomienda no mezclar con concentrados emulsionables, ya que puede haber fitotoxicidad .

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

